

Endoprothese in de slokdarm plaatsen

Endoscopieafdeling



Beter voor elkaar

Endoprothese in de slokdarm plaatsen

Leest u deze folder rustig door. Aan het eind van de folder staan een drietal vragen die betrekking hebben op het onderzoek en een eventuele behandeling. Dit formulier dient u ingevuld en ondertekend mee te brengen als u zich meldt op de dag van het onderzoek.

Het plaatsen van een endoprothese in de slokdarm

Binnenkort wordt u verwacht voor het plaatsen van een endoprothese (Slokdarmstent).

Het plaatsen van een endoprothese gebeurt d.m.v. een gastroscopie onder röntgendoorlichting. Via deze brochure informeren wij u over de gang van zaken omtrent dit onderzoek.

Geneesmiddel:	Stoppen; tenzij u behandelend arts anders aangeeft.
Sintrom / Acenocoumarol	Minimaal 5 dagen voor het onderzoek
Plavix	7 dagen voor het onderzoek
Aspirine / Ascal / Acetosal	Hoeft niet gestopt te worden
Marcoumar	Minimaal 10 dagen voor het onderzoek

Vorbereiding

Het is belangrijk als u anti-stollingsmedicijnen gebruikt dit voor het onderzoek te melden aan de specialist die het onderzoek uitvoert.

Overleg tevoren met uw behandelend arts of deze medicijnen voor het onderzoek gestaakt mogen worden, u hoort dan ook wanneer u ze weer in mag nemen.

Het onderzoek kan alleen goed uitgevoerd worden als uw slokdarm en maag leeg zijn. **U mag daarom op de dag van het onderzoek vanaf 12 uur 's nachts niets meer eten of drinken.**

Het is prettig voor u als u tijdens het onderzoek geen knellende kleding draagt. Op een afgesproken tijdstip wordt u naar de betreffende afdeling gebracht. In enkele gevallen wordt er gebruik gemaakt van röntgen doorlichting. Daar wordt u ontvangen door een assistente, die tijdens het onderzoek bij u blijft. Zij zal de arts assisteren tijdens de behandeling.



Het plaatsen van een endoprothese

In verband met een vernauwing in uw slokdarm wordt er een stent bij u geplaatst. Er wordt dan een buisje ingebracht op de plaats van de vernauwing. Dit gebeurt met een gastroscoop (flexibele slang). Voor dit onderzoek krijgt u een slaapmiddel (Midazolam®).

De endoprothese wordt geplaatst om passageproblemen te verminderen. Na het plaatsen van de endoprothese kunt u weer eten en drinken. Echter de endoprothese is een hulpmiddel en kent geen spieractiviteit zoals de slokdarm dat zelf heeft. Het is daarom belangrijk om te voorkomen dat de endoprothese door voeding verstopt raakt (zie voedingsadviezen).

Duur van de behandeling

Het onderzoek zelf duurt meestal niet langer dan 20 tot 30 minuten.

Wat is Midazolam®

Midazolam® is een effectief slaapmiddel (hypnoticum) en valt in de categorie benzodiazepinen. Wij willen u graag informeren over de eventuele complicaties bij het gebruik van Midazolam®.

In lichte mate zijn de symptomen onder andere slaperigheid, geestelijke verwardheid en lusteloosheid (lethargie). In ernstige mate zijn de symptomen onder andere een coördinatiestoornis van de spieren (ataxie) verlaagde spierspanning (hypotonie), verlaagde bloeddruk (hypotensie) en ademdepressie.

Na de behandeling

Na de plaatsing van de endoprothese kunt u een lichte druk op de borst ervaren.

Deze lichte druk verdwijnt weer vanzelf. Een paar uur na plaatsing van de endoprothese (wanneer u goed wakker bent) begint u met een helder vloeibaar dieet.

Voedingsadviezen:

Nadat de stent is geplaatst (en het vloeibare dieet wordt goed verdragen) is het belangrijk de volgende voedingsadviezen op te volgen om te voorkomen dat de stent verstopt raakt

- Vermijd het volgende voedsel:
 - rundvlees, biefstuk, taai en draderig vlees
 - hard gekookte eieren, vezelige groenten (bv. zuurkool, taugé etc)
 - appel, sinaasappel en grapefruit
 - noten, peulvruchten zoals bruine bonen en kapucijners
 - oud brood, broodkorsten en liever geen witbrood
- Probeer rustig te drinken en te eten
- Het is belangrijk om het voedsel goed te kauwen (te snijden of te prakken) eventueel het eten eerst in de keukenmachine doen of pureren met een staafmixer.

Drink na elke maaltijd en tussendoor koolzuur (CO₂) bevattende dranken (bv: Spa rood en Cola) om de wand van de prothese te “reinigen”

Wat zijn de complicaties/bijwerkingen van de behandeling

Als u voor het onderzoek een slaapmiddel heeft gekregen. In dat geval kan het zijn dat u tijdelijk vergeetachtig en suf bent, dit is meestal na een paar uur over.

In verband hiermee is het niet toegestaan zelf een auto te besturen of alleen met het openbaar vervoer te reizen.

Eventuele complicaties van het plaatsen van een endoprothese:

In het algemeen zijn de bijwerkingen gering, maar ze kunnen wel optreden, zoals bijvoorbeeld:

- Slikklachten door verstopping van de prothese. Doorzakken van de prothese door vernauwing naar de maag.
- Het ontstaan van een verbinding (fistel) tussen slokdarm en luchtwegen.
- Het groeien van tumorweefsel boven of onder de prothese.

De volgende klacht komt zelden voor:

- Een scheurtje in de slokdarm. Dit wordt meestal gezien op een röntgenfoto. Als een scheurtje wordt geconstateerd, kunnen sondevoeding en antibiotica worden gegeven en herstelt een scheurtje meestal binnen enkele dagen

Controle

Een regelmatige controle is niet altijd noodzakelijk. De huisarts en/of de wijkverpleegkundige zijn goed geïnformeerd en zij zullen u thuis zo goed mogelijk verzorgen en begeleiden.

In bijzondere situaties is de specialist altijd bereid uw vragen te beantwoorden en zo mogelijk problemen te verhelpen.

Wilt u verder nog informatie, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de endoscopieafdeling.

Telefoonnummers

De volgende telefoonnummers zijn voor u van belang als u de arts of de endoscopieafdeling wilt bereiken:

- van maandag tot en met vrijdag van 8.15 – 16.30 uur:

T 010 297 53 74 endoscopieafdeling

- buiten kantooruren dienstdoende arts assistent Inwendige geneeskunde via de receptioniste:

T 010 297 50 00

Mocht u thuis nog vragen hebben over het onderzoek, belt u dan met de endoscopieafdeling.

www.ikazia.nl

“Informed Consent”

Wat is Informed consent?

Als u ziek wordt kunt u in een medische malle molen terecht komen.

Onderzoeken en behandelingen volgen elkaar op. Hebt u daar zelf eigenlijk nog wat over te vertellen?

Het antwoord is ja. U mag zelf beslissen of u behandeld wordt. En u mag ook kiezen welke behandeling u krijgt. Om goed te kunnen kiezen, moet u wel alle informatie hebben. Doormiddel van deze folder geven wij u deze informatie.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten als patiënt (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), dan kunt u terecht bij het patiënten service bureau op de begane grond. Daar ligt een brochure voor u klaar.

Informed Consent formulier

Het plaatsen van een Endoprothese in de slokdarm.

Ik ben na het lezen van deze folder wel / niet (doorstrepen wat niet van toepassing is) voldoende geïnformeerd over de betreffende behandeling en het gebruik van Midazolam®.

Ik ga wel / niet (doorstrepen wat niet van toepassing is) akkoord met de betreffende behandeling.

Ik ga wel / niet (doorstrepen wat niet van toepassing is) akkoord met het gebruik van Midazolam®.

(plaats).....

(datum).....

.....
handtekening patiënt

.....
handtekening behandelend arts



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Endoprotese in de slokdarm plaatsen
800104-NL / 2012-08