

Dilatatiebehandeling van de slokdarm

Maag-Darm-Levercentrum



Beter voor elkaar

Inleiding

Door middel van deze folder wil het Ikazia Ziekenhuis u informeren over de behandeling die voor u is afgesproken. Hierin wordt omschreven wat de behandeling inhoudt en hoe de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg van de behandeling zijn. Wij adviseren u om deze informatie zorgvuldig te lezen.

Wat is een dilatatiebehandeling van de slokdarm

Dilatatie van de slokdarm is het oprekken van de slokdarm met behulp van kunststof sondes (buisje) of met behulp van een dilatatieballon. Eerst moet de arts de plaats van de vernauwing bepalen. Dit gebeurt door middel van een gastroscopie. Dit is een onderzoek, waarbij de arts via een dunne flexibele slang de maag kan bekijken. Binnen enkele minuten kan zo worden gezien of er een afwijking is in de slokdarm, maag of twaalfvingerige darm.

Antistollingmedicijnen

Als u antistollingsmedicijnen gebruikt, dient u het onderstaande schema in

Geneesmiddel:	Stoppen; tenzij u behandelend arts anders aangeeft.
Sintrom / Acenocoumarol	Minimaal 5 dagen voor het onderzoek
Plavix	7 dagen voor het onderzoek
Aspirine / Ascal / Acetosal	Hoeft niet gestopt te worden
Marcoumar	Minimaal 10 dagen voor het onderzoek

acht te nemen. Overleg wel met uw behandelend arts of deze medicijnen voor de behandeling gestaakt mogen worden. Het is belangrijk als u antistollingsmedicijnen gebruikt dit voor de behandeling te melden aan de specialist die het onderzoek uitvoert.

-TABEL invoegen-

De behandeling kan alleen goed uitgevoerd worden als uw slokdarm en maag leeg zijn. **U mag daarom 3 dagen voorafgaand aan de behandeling alleen vloeibaar eten. Op de dag voor de behandeling mag u vanaf 12 uur**

's nachts niets meer eten of drinken.

Procedure op de afdeling

Vorbereiding

Als u aankomt, dient u zich bij de balie te melden. Hierna u kunt plaatsnemen in de wachtruimte. U wordt uit de wachtruimte opgehaald en naar de voorbereidingsruimte gebracht.

Hier wordt in de arm of in de hand een plastic buisje in een ader ingebracht (infuus). Verder wordt een manchet om de arm bevestigd, waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Ook krijgt u een knijper op de vinger, waarmee het hartritme en het zuurstofgehalte van het bloed worden geregistreerd. We rijden u op bed naar de onderzoekskamer. Hier krijgt u een slangetje in de neus, waardoor extra zuurstof wordt toegediend. Vervolgens krijgt u via het infuus de algemene verdoving (het roesje), bestaande uit een combinatie van een pijnstillert (Fentanyl) en een rustgevend middel (Midazolam). Door dit roesje zult u weinig merken van de behandeling en zult u zich er later vrijwel niets meer van herinneren.

Omdat de behandeling onder een roesje wordt gedaan, moet u na afloop van de behandeling door een familielid of kennis naar huis gebracht worden. **Het is wettelijk niet toegestaan om op de dag van de behandeling zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. U mag die dag niet zelf een auto of motorfiets besturen, u mag ook niet zonder begeleiding fietsen of met het openbaar vervoer reizen.**

Indien u in gezelschap komt, dient uw begeleiding tijdens de behandeling in de wachtruimte te wachten. Het is niet toegestaan dat uw begeleiding tijdens de behandeling aanwezig is op de onderzoekskamer.

Het kan een enkele keer voorkomen dat, door onvoorziene omstandigheden, de behandeling door een andere endoscopist wordt uitgevoerd.

De behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door een endoscopist/MDL arts, die wordt geassisteerd door een endoscopie-assistent. Vlak voor de behandeling komt dit endoscopie-team bij elkaar om aan de hand van een lijst een aantal gegevens te controleren. Dit heet een time out procedure.

Bij een dilatatie wordt de vernauwing opgerekt.

De gastroscopie wordt uitgevoerd terwijl u op de onderzoektafel op uw linkerzijde ligt. Als u een gebitsprothese in heeft vragen we u die uit te doen, anders krijgt u een ring in de mond om zowel uw tanden als de scoop te beschermen. Vervolgens krijgt u via het infuus de algemene verdoving (het roesje), bestaande uit een combinatie van een pijnstillertje (Fentanyl) en een rustgevend middel (Midazolam).

Door dit roesje kunt u weinig merken van de behandeling en kan het zijn dat u zich er later vrijwel niets meer van herinnert. Tijdens het inbrengen van de slang, via de mond, wordt u gevraagd een slikbeweging te maken en daarna proberen zo rustig mogelijk en ontspannen mogelijk te ademen. U kunt net zo ademen als anders.

Bij het terugtrekken van de gastroscopie wordt er een voerdraad achtergelaten in de slokdarm. Over deze voerdraad wordt vervolgens een dilatatieballon ingebracht in de slokdarm. Met behulp van deze ballon wordt de vernauwing opgerekt. (De ligging van de ballon (positie van de vernauwing) wordt door middel van röntgenstraling gecontroleerd (wel of niet op de röntgen?)). De ballon wordt voorzichtig opgeblazen gedurende een paar minuten om zo de vernauwing op te rekken. Het oprekken (dilateren) van de vernauwing pijnlijk kan zijn, vandaar dat u voor de behandeling pijnstilling (Fentanyl) via het infuus heeft gekregen.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt meestal niet langer dan 20 tot 30 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling rijden wij u op bed naar de uitslaapruijnte van het MDL centrum. Als u goed wakker bent, krijgt u wat drinken en een vezelrijke versnapering aangeboden. U mag dan weer gewoon eten en drinken. Meestal mag u na 1 uur – 1½ uur de uitslaapruijnte verlaten.

Nogmaals, het is wettelijk niet toegestaan om op de dag van de behandeling zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. U mag die dag dus niet zelf een auto of motorfiets besturen, maar u mag ook niet zonder begeleiding fietsen of met het openbaar vervoer reizen.

Eventuele bij- of nawerkingen

Dilatatie is een veilige behandeling voor een vernauwing. Toch kunnen er bij uitzondering complicaties optreden. In enkele gevallen wordt er tijdens het opblazen van de ballon een perforatie (scheurtje) in de slokdarm of maag gemaakt. Wanneer er vastgesteld wordt dat er een perforatie is gemaakt, wordt u opgenomen op de afdeling. Daar krijgt u een antibiotica infuus. De kans bestaat dat de sluitspier zover wordt opgerekt dat deze de maag niet goed meer kan afsluiten. Daardoor kan zure maaginhoud terugstromen naar de slokdarm (reflux). Reflux is met medicijnen te behandelen.

Het kan zijn dat u last heeft van een pijnlijke keel na de behandeling, vooral als u heeft moeten hoesten. Dit gevoel kan enkele dagen duren. Misschien heeft u een opgeblazen gevoel: opboeren of winden laten geeft dan verlichting.

Als er na het onderzoek klachten optreden kunt u contact opnemen met de arts die het onderzoek heeft verricht.

WAT ZIJN MIDAZOLAM EN FENTANYL.

Midazolam behoort tot de groep van benzodiazepines, dit zijn rustgevendende middelen en slaapmiddelen. Midazolam werkt snel, met een maximale werking binnen enkele minuten. De werking verdwijnt snel, binnen 1 tot 2 uur, maar het middel is pas na 12 uren geheel uitgewerkt. Midazolam zorgt voor slaperigheid, angstremming en ontspanning. Sommige mensen vallen

door het medicijn echt in slaap, maar vaak geeft het vooral een doezelig gevoel. Verder verstoort Midazolam tijdelijk het korte geheugen, waardoor u zich weinig zult herinneren van het onderzoek. Bijwerkingen zijn verlaagde bloeddruk (hypotensie), verminderde ademhaling, geestelijke verwardheid, lusteloosheid (lethargie), verlaagde spierspanning (hypotonie), coördinatiestoornis van de spieren (ataxie).

Fentanyl behoort tot de groep van opioïden, waartoe ook bijvoorbeeld morfine behoort. Fentanyl geeft een krachtige pijnstilling, maar versterkt ook het rustgevende effect van Midazolam. Het effect treedt snel op, binnen enkele minuten.

Bijwerkingen zijn spierstijfheid (spierigiditeit), verminderde ademhaling (ademhalingsdepressie), verlaagde bloeddruk (hypotensie), verlaagde hartslag (bradycardie), misselijkheid, braken en duizeligheid.

Telefoonnummers

De volgende telefoonnummers zijn voor u van belang als u de arts of het MDL-centrum wilt bereiken:

Maandag tot en met vrijdag van 8.15 – 16.30 uur:

T 010 297 53 74

(MDL-centrum)

Buiten kantooruren:

T 010 297 50 00

(vraag naar de dienstdoende arts-assistent Inwendige Geneeskunde, via de receptioniste)

Mocht u thuis nog vragen hebben over het onderzoek, belt u dan naar het MDL-centrum Ikazia:

T 010 297 53 74

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Slokdarm, dilatatiebehandeling van de
800106-NL / 2015-06