

# Blaasonderzoek/cystoscopie

Urologie



Beter voor elkaar



## Inleiding



Er zal binnenkort bij u een cystoscopie worden uitgevoerd. Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop, een dunne holle buis gevuld met glasvezels of een lenzensysteem die aangesloten is op een lichtbron. Via een lens op het uiteinde van de cystoscoop kan de specialist door een kijker in de plasbuis en de blaas kijken.

Er bestaan buigzame (flexibele) en metalen (starre) cystoscopen.

Beide kunnen zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt worden (zie de beide figuren op de volgende bladzijde).

Cystoscopie wordt verricht als er afwijkingen worden vermoed in plasbuis, prostaatgebied of blaas, bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of controle bij blaaspoliepen.



## Vorbereiding

Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig. Het onderzoek vindt poliklinisch plaats door de uroloog in bijzijn van een verpleegkundige / assistente. U wordt naar een kleedkamer gebracht waar u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken, de kleding van het bovenlichaam houdt u aan.

Vaak is het nodig om vóór de cystoscopie urine op te vangen voor onderzoek.

Als dit bij u nodig is, vraagt de assistente dit tijdig aan u. Hierna neemt u plaats op de scopiestoel. Voor het onderzoek is het nodig dat u met gespreide benen, in speciaal hiertoe ontwikkelde beensteunen, op de scopiestoel ligt. Vervolgens wordt de penis of schede gereinigd met een desinfecterende vloeistof. In de plasbuis wordt, alleen bij mannen, vervolgens wat gel gespoten. Deze gel dient als glijmiddel en als verdovingsmiddel van het slijmvlies, zodat eventuele pijn tot een minimum wordt beperkt. De gel moet enkele minuten inwerken. Van belang is dat u, voor zover mogelijk, goed ontspannen bent, zodat het inbrengen van de cystoscoop met het minst mogelijke ongemak gepaard kan gaan.

## **Uitvoering van het onderzoek**

De specialist brengt de cystoscoop via de opening van de plasbuis in de blaas.

Via een slangetje dat aan de cystoscoop verbonden is met een zak spoelvloeistof wordt er steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kunt u aandrang tot plassen krijgen. Dit gebeurt echter pas op het moment dat de blaas vol is. De blaas zal nooit overvol raken. De uroloog inspecteert de plasbuis en de blaas. Daarna is het onderzoek afgelopen. Wanneer de flexibele scoop gebruikt is, moet u zelf de spoelvloeistof uitplassen en verlaat u de scopiestoel dus met gevulde blaas.

## **Nazorg**

U krijgt direct de uitslag. Het onderzoek duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Na afloop kunt u vrijwel meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

## **Bijwerkingen**

Na het onderzoek kan het eerste uur, bij sommige patiënten, gedurende enkele dagen een branderig gevoel bij het plassen optreden en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. Het is belangrijk, dat u na het onderzoek veel drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld.

Wanneer u na de ingreep langdurig klachten heeft, of veel pijn of koorts boven 38,5° C of aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

## **Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?**

Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder neem dan contact op met polikliniek Urologie.

Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 16.00 uur.

### **Polikliniek Urologie (route 11)**

T 010 297 54 50

### **Urologieverpleegkundige**

T 010 297 53 46





**Ikazia Ziekenhuis**  
Montessoriweg 1  
3083 AN Rotterdam  
[www.ikazia.nl](http://www.ikazia.nl)

Blaasonderzoek (Cystoscopie)  
800146-NL / 2014-04