

Circumcisie (besnijdenis)

Dagbehandeling / Kort verblijf



Beter voor elkaar

Inleiding

Binnenkort wordt bij uw zoon een besnijdenis verricht. In deze folder willen wij u of uw zoon informeren over de voorbereidingen op de operatie, de operatie en de nazorg.

De operatie wordt door de uroloog of de chirurg uitgevoerd.

Een besnijdenis (circumcisie)

Meestal vindt een besnijdenis plaats omdat de voorhuid van de penis te nauw is.

Hierdoor kunnen kinderen en volwassenen problemen hebben met plassen.

Ook kan er een ontsteking van de eikel of voorhuid ontstaan.

Bij volwassenen kan een vernauwde voorhuid pijn veroorzaken tijdens een erectie en geslachtsgemeenschap. Een besnijdenis kan verder verricht worden als uw geloofsovertuiging dit voorschrijft of uit hygiënische overwegingen.

Bij een besnijdenis wordt een gedeelte of de gehele voorhuid van de penis operatief verwijderd. De arts heeft dit met u besproken.

De operatie

Deze operatie gebeurt bij kinderen onder volledige anesthesie. Dit betekent dat uw zoon tijdens de operatie slaapt.

De penis wordt na de verdoving gedesinfecteerd en de schaamstreek wordt met steriele doeken afgedekt. Tijdens de operatie wordt de voorhuid (gedeeltelijk) verwijderd.

Rondom de basis van de eikel worden oplosbare hechtingen geplaatst.

De operatie duurt ongeveer 20–30 minuten.

Voor algemene informatie rondom de opname is het belangrijk dat u onderstaande folders voor de opname leest. De folders heeft u ontvangen op de preoperatieve polikliniek.

Folders voor kinderen:

- Uw kind op de Dagbehandeling (informatie voor ouders).
- Pijnstilling en eten/ drinken voor de operatie: zie anesthesiefolder.

Folders voor volwassenen:

- Welkom op de Dagbehandeling / Kort verblijf
- Anesthesie (over pijnstilling en eten/ drinken voor de operatie)

Nazorg na de operatie

Na de operatie mag uw zoon wat drinken en als dat goed gaat wat eten. Als uw zoon geplast heeft komt de arts kijken hoe het gaat, daarna mag uw zoon met ontslag.

De penis is meestal verbonden met een vettig gaas of zalf en met steriele gazen.

Omdat de voorhuid (gedeeltelijk) is verwijderd, is de eikel meestal onbedekt. De eerste dagen kan de eikel gevoelig zijn. Tijdens de operatie zijn de aanwezige verklevingen tussen de voorhuid en de eikel losgemaakt. De eikel kan hierdoor een paar dagen rood en gezwollen zijn. Ook kunnen korstjes op de eikel ontstaan. Na ruim een week ontstaat er geleidelijk een nieuwe huidlaag.

Nazorg thuis

- U krijgt een potje zalf mee, of een recept hiervoor. De eerste twee dagen moet er ± 5 maal per dag gezalfd worden.

U doet dit als volgt:

U doet een klein beetje zalf op een gaasje en smeert dit uit. Het gaasje wikkelt u om de penis. Om zwelling te voorkomen dient de penis zoveel mogelijk omhoog te leggen. U kunt dit doen door een strakke onderbroek te (laten) dragen. Het is heel belangrijk de wond schoon te houden.

Dit kan door elke dag te douchen. U mag echter de eerste twee weken geen zeep of badschuim gebruiken.

- De hechtingen in de wond lossen vanzelf op.

Mogelijke complicaties

Bij deze operatie zijn de volgende complicaties mogelijk:

Er kan een nabloeding optreden. Een nabloeding uit zich in een bloederig verband of een bloeduitstorting onder een hechting. Soms treedt er een infectie of een abces, dit is een met pus gevulde zwelling, op.

U moet bij onderstaande klachten contact opnemen met het ziekenhuis:

- toenemende pijnklachten.
- er komt pus uit de wond.
- de penis wordt dikker.
- koorts boven de 38,5°C.

U kunt bij bovenstaande klachten contact opnemen met de afdeling dagbehandeling (maandag tot vrijdag tijdens kantooruren):

T 010 297 52 24

Of de polikliniek chirurgie (als de operatie door de chirurg uitgevoerd is):

T 010 297 52 20

Of de polikliniek urologie (als de operatie door de uroloog uitgevoerd is):

T 010 297 54 50

Of de SEH (spoedeisende hulp):

T 010 297 53 00



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Circumcisie (besnijdenis)
800161-NL / 2012-08

