

Blaasonderzoek

Cystoscopie bij kinderen

Dagbehandeling / Kort verblijf



Beter voor elkaar



Inleiding

Er zal binnenkort bij uw kind een cystoscopie worden uitgevoerd. In deze folder willen wij u en uw kind informeren over de voorbereiding voor het onderzoek en de nazorg.

Wat is een cystoscopie onderzoek?

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop, een dunne holle buis gevuld met glasvezels of een lenzensysteem, die aangesloten is op een lichtbron. Via een lens op het uiteinde van de cystoscoop kan de specialist door een kijker in de plasbuis en de blaas kijken.

Er bestaan buigzame (flexibele) en metalen (starre) cystoscopen. Beide kunnen zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt worden (zie de beide figuren).



Een cystoscopie wordt verricht indien er afwijkingen worden vermoed in plasbuis, prostaatgebied of blaas, bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of controle bij blaaspoliepen.

Vorbereiding

Bij een kind gebeurt een cystoscopie altijd onder volledige anesthesie op de operatiekamer. Dit betekent dat uw kind dan slaapt. Uw kind wordt voor dit onderzoek een dagdeel opgenomen op de afdeling dagbehandeling.

Voor algemene informatie rondom de opname is het belangrijk dat u onderstaande folders voor de opname leest. De folders heeft u ontvangen op de preoperatieve polikliniek.

Folders:

- Uw kind op de dagbehandeling (informatie voor ouders).
- Pijnstilling en eten/ drinken voor de operatie: zie anesthesiefolder.

Het onderzoek

De specialist brengt de cystoscoop via (de opening van) de plasbuis in de blaas. Via een slangetje aan de cystoscoop verbonden met een zak spoelvloeistof wordt er steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich. Dit gebeurt echter pas op het moment dat de blaas vol is. De blaas zal nooit overvol raken.

De uroloog inspecteert de plasbuis en de blaas. Soms krijgt uw kind kortdurend een blaaskatheter. Voor het ontslag wordt deze weer verwijderd.

Nazorg

Na het onderzoek mag uw kind wat drinken en als dat goed gaat wat eten. Zodra uw kind voldoende drinkt en geplast heeft komt de arts kijken hoe het met uw kind gaat, en beslist of uw kind naar huis kan. Uw kind moet minimaal tot vier uur na het onderzoek in het ziekenhuis blijven. De uroloog bespreekt na het onderzoek de uitslag met u en uw kind.

Na het onderzoek kan uw kind het eerste uur tot enkele dagen daarna een branderig gevoel hebben bij het plassen. Ook kan uw kind versterkte aandrang tot plassen hebben. Er kan wat bloed in de urine zitten. Deze klachten zijn niet verontrustend of gevaarlijk.

De klachten verdwijnen vanzelf. We raden u aan om uw kind na de operatie veel te laten drinken. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld. Na twee weken wordt uw kind op de polikliniek terugverwacht voor controle, deze afspraak krijgt u van de verpleegkundige.

Wanneer een arts waarschuwen?

Als uw kind na het onderzoek last krijgt van onderstaande klachten, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw behandelend arts:

- langdurig last van een branderig gevoel bij het urineren;
- veel bloed bij de urine;
- een aanhoudende aandrang tot plassen;
- veel pijn in de buik of bij het plassen;
- koorts boven de 38,5°C;
- moeite met plassen.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen heeft kunt u hiermee terecht bij de arts of een verpleegkundige van de polikliniek of de afdeling Dagbehandeling.

Polikliniek urologie:

T 010 297 54 50

Urologie verpleegkundige:

T 010 297 53 46

Afdeling dagbehandeling:

T 010 297 52 24

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis

Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Blaasonderzoek (Cystoscopie) bij kinderen
800168-NL / 2012-08

