

Sacro-iliacale blokkade

Pijnbestrijding



Beter voor elkaar

Sacro-iliacale blokkade

De medisch specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten tot een zogenaamde S.I. blokkade over te gaan.

In deze brochure vindt u informatie over deze behandeling. Ongeveer twee weken voor de behandeling krijgt u een schriftelijke oproep.

Algemeen

De behandeling vindt plaats op de operatieafdeling. Het doel van de behandeling is om uw klachten te laten verminderen of te laten verdwijnen.

De specialist probeert via een proefblokkade (plaatselijke verdoving) een medicijn achter te laten tot bij de gewrichtsspleet.

Na een geslaagde (positieve) proefblokkade zal de pijn tijdelijk verminderen.

Na verloop van tijd kan dan ook een definitieve S.I. blokkade worden uitgevoerd.

Dit wordt door middel van elektrische impulsen gedaan.

Een definitieve S.I. blokkade kan langere tijd pijnvermindering geven en kan zonodig worden herhaald.

Vorbereiding

De behandeling vindt plaats in dagbehandeling. Dit betekent dat u zich op de afgesproken dag en tijd meldt bij de afdeling Opname, vanwaar u naar de afdeling Dagbehandeling wordt gebracht.

Hier wordt u uw bed gewezen en u krijgt een blauw operatiejasje wat u aan moet trekken. Het kan zijn dat u even moet wachten tot u aan de beurt bent. Vervolgens wordt u met bed, naar de operatieafdeling gebracht.

Behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op de buik met een kussen onder het bekken. Onder röntgendoorlichting worden de naalden in de juiste positie geplaatst en wordt een medicijn achtergelaten. Wanneer door deze behandeling de pijn kort of langdurig afneemt, is dit een indicatie voor een vervolgbehandeling.

Als een definitieve S.I. blokkade wordt uitgevoerd, gebruikt de specialist kleine elektrische pulsen om te bepalen of de punt van de naald op de juiste plaats ligt.

Hierna wordt de zenuw met elektrische pulsen behandeld en na afloop wordt de naald verwijderd.

Na de behandeling blijft u nog even in de voorbereidingsruimte om te herstellen van de behandeling. Daarna wordt u teruggebracht naar de afdeling Dagbehandeling en wanneer alles goed is mag u naar huis.

- Na een S.I. blokkade kan er napijn optreden;
- Na een definitieve S.I. blokkade kan tijdelijk krachtsverlies optreden;
- Na de behandeling mag u niet alleen naar huis, en u mag niet zelf autorijden!;
- Gebruikt u bloedverdünnende medicijnen, overlegt u dan met de arts over het gebruik hiervan;
- Bij zwangerschap of als u koorts heeft kan de behandeling niet uitgevoerd worden.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Pijnbestrijding.

Maandag tot en met vrijdag van 8.15 – 16.30 uur

T 010 297 54 30

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Sacro-iliacale blokkade
800187-NL / 2012-09