

Facetblokkade

Pijnbestrijding



Beter voor elkaar

Blokkade van de facetgewrichtjes (facetblokkade)

De specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten om tot een facetblokkade over te gaan. Ongeveer twee weken voor de behandeling krijgt u een schriftelijke oproep.

In deze folder vindt u informatie over de behandeling, die kan bestaan uit een proefblokkade of een definitieve blokkade.

Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan de specialist of verpleegkundige.

Algemeen

De behandeling vindt plaats op de operatiekamer. U wordt dringend verzocht geen sieraden of piercings te dragen, laat deze kostbaarheden thuis.

Het doel van de behandeling is de zenuw, die de pijnprikkel geleidt, zodanig te behandelen zodat de pijnprikkel niet meer kan worden doorgegeven aan de hersenen.

De specialist probeert vast te stellen door een proefblokkade (plaatselijke verdoving) welke zenuw de pijn geleidt.

Na een geslaagde (positieve) proefblokkade zal de pijn tijdelijk verminderen.

Nadat de pijngeleidende zenuw is opgespoord kan een definitieve facetblokkade worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan door elektrische pulsen. Een definitieve facetblokkade kan langere tijd pijnvermindering geven en zondig worden herhaald.

Vorbereiding

De behandeling vindt plaats in dagopname.

Dit betekent dat u zich op de dag van de behandeling, op de afgesproken tijd, bij de opname komt melden, waarna u naar de afdeling

Dagbehandeling wordt gebracht.

Hier krijgt u een bed en een blauw operatiejack wat u aantrekt.

Het kan zijn dat u nog even moet wachten voor u aan de beurt bent.

U wordt naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling gebracht.

Hier wordt u ontvangen door de medewerkers van de holding. Zij controleren uw gegevens op allergieën, gebruik van antistolling en de juiste locatie van de behandeling om links/ rechts verwisseling te voorkomen.

Behandeling

De behandeling gebeurt afhankelijk van de plaats waar de pijn zich bevindt in rug- of buikligging.

Onder röntgendoorlichting worden de naalden in de juiste positie geplaatst, en een medicijn wordt achtergelaten.

Wanneer door deze behandeling de pijn kort of langdurig afneemt, is dit een indicatie voor een vervolgbehandeling.

Wanneer een definitieve facetblokkade wordt uitgevoerd, gebruikt de specialist kleine elektrische pulsen om te bepalen of de punt van de naald op de juiste plaats ligt.

Daarna kan de zenuw met elektrische pulsen worden behandeld en wordt de naald verwijderd.

Na de behandeling gaat u terug naar de voorbereidingsruimte, waar u nog even kan herstellen van de behandeling.

Daarna gaat u terug naar de afdeling dagbehandeling en wanneer alles goed is mag u naar huis.

- Na een zenuwblokkade kan er napijn optreden;
- Na een proefblokkade of definitieve zenuwblokkade kan er tijdelijk krachtsverlies optreden;
- U mag niet alleen naar huis en mag niet zelf autorijden;
- Bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen, graag voor de behandeling overleggen met de arts.
- Bij zwangerschap of koorts kan de behandeling niet doorgaan.

Polikliniek Pijnbestrijding

T 010 297 54 30

www.ikazia.nl



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.