

Lumbale sympaticus blokkade

Pijnbestrijding



Beter voor elkaar

Lumbale sympaticus blokkade

De specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten om tot een lumbale sympaticus blokkade over te gaan.

In deze folder vindt u informatie over de behandeling.

Algemeen

- De behandeling vindt plaats op de operatiekamer. U wordt dringend verzocht geen sieraden of piercings te dragen, laat deze kostbaarheden thuis.
- Een lumbale sympaticus blokkade is een behandeling waarbij, met behulp van een of meerdere naalden een baan van het onwillekeurige zenuwstelsel wordt geblokkeerd.
- Deze baan verloopt aan de voorzijde van de wervelkolom.
- De behandeling wordt toegepast bij circulatie stoornissen aan het been, en bepaalde zenuwpijnen zoals fantoompijn.
- Ongeveer twee weken voor de behandeling ontvangt u een schriftelijke oproep.

Vorbereiding

De behandeling vindt plaats in dagopname.

Dit betekent dat u zich op de dag van de behandeling op de afgesproken tijd bij de opname komt melden, waarna u naar de afdeling dagbehandeling wordt gebracht.

U wordt naar een bed gebracht en u krijgt een blauw operatiejasje om aan te trekken.

Het kan zijn dat u nog even moet wachten voor u aan de beurt bent.

U wordt naar de voorbereidingsruimte van de operatie afdeling gebracht.

Behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik met een kussen onder uw bekken geschoven.

Bij de lumbale sympatectomie worden de naalden onder röntgendoorlichting via de rug ingebracht. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.

De blokkade vindt plaats met een chemische vloeistof en/of elektrische pulsen.

Door deze behandeling ontstaat er een betere doorbloeding in been of voet. In veel gevallen wordt de pijn minder.

Na de behandeling gaat u terug naar de voorbereidingsruimte, waar u nog even kan herstellen. Ook worden er nog wat controles gedaan.

Daarna wordt u weer naar de afdeling dagbehandeling gebracht. Als alles goed is mag u naar huis of anders moet u een nachtje blijven.

- Het is mogelijk dat er een tijdelijke zwelling kan optreden van been of voet, of een doof gevoel in lies of bovenbeen;
- In veel gevallen treedt er na de behandeling een napijn op, deze napijn is tijdelijk;
- Bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen, graag voor het onderzoek overleggen met de arts;
- Bij zwangerschap of koorts kan de behandeling niet doorgaan.

Polikliniek Pijnbestrijding

T 010 297 54 30

www.ikazia.nl



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.