

# Plexus coeliacus blokkade

Pijnbestrijding



Beter voor elkaar

## **Inleiding**

De plexus coeliacus blokkade is het uitschakelen van een zenuwnetwerk in de bovenbuik (plexus coeliacus).

Dit wordt toegepast bij ernstige pijnklachten vanwege kanker van organen in de bovenbuik, zoals de alvleesklier, de maag en de lever.

Medicijnen helpen niet genoeg bij deze pijn.

Een blokkade is bij de meerderheid van de patiënten effectief.

Er treedt een goede pijnvermindering op. Het effect houdt ongeveer een half jaar aan.

Voor deze behandeling is opname noodzakelijk. U wordt opgenomen op de afdeling dagbehandeling. U wordt dringend verzocht geen sieraden of piercings te dragen, laat deze kostbaarheden thuis.

Als u bloedverduunners gebruikt moet dit gemeld worden. Mogelijk dat uitstel van de behandeling noodzakelijk is!

## **Plexus coeliacus blokkade**

U krijgt tijdens de behandeling een infuusnaaldje in uw arm, waar als dit nodig is medicijnen door gegeven kunnen worden. De behandeling kan onder lokale verdoving plaatsvinden en duurt ongeveer 30 minuten; u ligt daarbij op uw buik.

Met behulp van twee naalden, welke onder röntgendoorlichting via de rug worden ingebracht, wordt de behandelvloeistof rondom het zenuwnetwerk gespoten. Hierdoor wordt de pijngeleiding (gedeeltelijk) onderbroken.

## **Na de plexus coeliacus blokkade**

Omdat de werking van meerdere zenuwen verstoord is, heeft u mogelijk de eerste uren na de blokkade last van diarree en misselijkheid.

Na de behandeling moet u tot vier uur na de injecties op bed blijven liggen. De verpleegkundige bij u op de afdeling zal regelmatig uw bloeddruk en hartslag opmeten.

Ook is het van belang alleen vloeibare voeding te eten gedurende één dag.

Een wat verdoofd gevoel van de buik/maag is normaal. Dit geldt ook voor schouderpijn.

Heeft u last van duizeligheid en/of toenemende pijn? Geef dit dan door aan de verpleegkundige.

## **Complicaties**

Omdat het plaatsen van de injecties onder röntgendoorlichting plaatsvindt, is de kans op complicaties klein.

Beschadiging van andere organen is zeldzaam door de verbeterde technieken. Dit betekent niet dat er geen risico's zijn.

Het plaatsen van een plexus coeliacus blokkade is niet bij iedereen effectief. Binnen 24 uur zal duidelijk zijn in hoeverre de blokkade bij u effect heeft gehad.

Wanneer u nog vragen heeft, stelt u die dan gerust aan de arts of verpleegkundige bij u op de afdeling.

## **Polikliniek Pijnbestrijding**

**T 010 297 54 30**

[www.ikazia.nl](http://www.ikazia.nl)



**Let op:** In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

**Please note:** This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

**Dikkat:** Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

**Uwaga:** Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

**انتبه:** هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.