

# Ascitespunctie of ascitesdrainage

Interne geneeskunde



Beter voor elkaar

## **Ascitespunctie of ascitesdrainage**

De arts heeft met u afgesproken een ascitespunctie / drainage te verrichten. Deze folder geeft u informatie over de manier waarop het onderzoek verricht wordt. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u deze dan gerust aan uw arts of aan de verpleegkundige.

### **Wat is een ascitespunctie / ascitesdrainage**

Dit is een handeling waarbij vocht uit de buik gehaald wordt.

Het kan zijn dat de arts het vocht wil wegsturen voor onderzoek om te kijken wat u mankeert.

Het kan ook zijn dat de arts het vocht door middel van een katheter uit de buik wil laten lopen ter ontlasting van uw buikproblemen.

De handeling is niet erg pijnlijk daar u van tevoren plaatselijk goed verdoofd wordt.

Wanneer de arts alleen ascitesvocht uit de buik haalt voor onderzoek is het binnen 20 minuten klaar. Wanneer de katheter blijft zitten heeft u na de handeling nog bedrust.

### **Vorbereiding**

Bij een ascitesdrainage wordt er een naaldje met infuus bij u aangebracht in de arm.

Als u veel ascitesvocht verliest wordt dit soms aangevuld met een eiwitrijke vloeistof via het infuus.

## **Het onderzoek**

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug met ontblote buik.

De arts zal eerst de plaats bepalen waar er in de buik geprikt zal worden. Hierna zal hij/ zij de buik desinfecteren en de plaats verdoven met verdovingsinjectie.

Als de plaats niet gevoelig meer is wordt de huid aangeprikt met een naald en spuit voor ascitesvocht om te onderzoeken.

Wordt het een drainage dan wordt de katheter in uw buik gebracht.

Heeft u tussen door pijn dan moet u dit aangeven en wordt er verdovingsvloeistof bij gespoten.

Bij het afnemen van vocht voor onderzoek wordt nadat ascites verkregen is de huid verbonden en is het onderzoek voorbij.

Bij een ascitesdrainage wordt de katheter goed gefixeerd en verbonden en heeft u bedrust zolang de katheter blijft zitten.

## **Na het onderzoek**

Bij een ascitespunctie wordt het materiaal opgestuurd en duurt het enige dagen voor de uitslag hiervan bekend is.

Het wondje wordt gecontroleerd op nabloeden/ nalekken.

Bij een ascitesdrainage wordt uw bloeddruk en polsslag regelmatig gecontroleerd, omdat ten gevolge van verlies van veel ascitesvocht de bloeddruk kan dalen.

Tijdens de drainage heeft u een infuus.

Wanneer de asciteskatheter wordt verwijderd hoeft u geen bedrust meer te houden.

De wond wordt gecontroleerd op nabloeden/ lekken.



**Let op:** In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

**Please note:** This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

**Dikkat:** Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

**Uwaga:** Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

**انتبه:** هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.