

Ascitespunctie of ascitesdrainage

Interne geneeskunde



Beter voor elkaar

Ascitespunctie of ascitesdrainage

De arts heeft met u afgesproken een ascitespunctie / drainage te verrichten. Deze folder geeft u informatie over de manier waarop het onderzoek verricht wordt. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u deze dan gerust aan uw arts of aan de verpleegkundige.

Wat is een ascitespunctie / ascitesdrainage

Dit is een handeling waarbij vocht uit de buik gehaald wordt.

Het kan zijn dat de arts het vocht wil wegsturen voor onderzoek om te kijken wat u mankeert.

Het kan ook zijn dat de arts het vocht door middel van een katheter uit de buik wil laten lopen ter ontlasting van uw buikproblemen.

De handeling is niet erg pijnlijk daar u van tevoren plaatselijk goed verdoofd wordt.

Wanneer de arts alleen ascitesvocht uit de buik haalt voor onderzoek is het binnen 20 minuten klaar. Wanneer de katheter blijft zitten heeft u na de handeling nog bedrust.

Vorbereiding

Bij een ascitesdrainage wordt er een naaldje met infuus bij u aangebracht in de arm.

Als u veel ascitesvocht verliest wordt dit soms aangevuld met een eiwitrijke vloeistof via het infuus.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug met ontblote buik.

De arts zal eerst de plaats bepalen waar er in de buik geprikt zal worden. Hierna zal hij/ zij de buik desinfecteren en de plaats verdoven met verdovingsinjectie.

Als de plaats niet gevoelig meer is wordt de huid aangeprikt met een naald en spuit voor ascitesvocht om te onderzoeken.

Wordt het een drainage dan wordt de katheter in uw buik gebracht.

Heeft u tussen door pijn dan moet u dit aangeven en wordt er verdovingsvloeistof bij gespoten.

Bij het afnemen van vocht voor onderzoek wordt nadat ascites verkregen is de huid verbonden en is het onderzoek voorbij.

Bij een ascitesdrainage wordt de katheter goed gefixeerd en verbonden en heeft u bedrust zolang de katheter blijft zitten.

Na het onderzoek

Bij een ascitespunctie wordt het materiaal opgestuurd en duurt het enige dagen voor de uitslag hiervan bekend is.

Het wondje wordt gecontroleerd op nabloeden/ nalekken.

Bij een ascitesdrainage wordt uw bloeddruk en polsslag regelmatig gecontroleerd, omdat ten gevolge van verlies van veel ascitesvocht de bloeddruk kan dalen.

Tijdens de drainage heeft u een infuus.

Wanneer de asciteskatheter wordt verwijderd hoeft u geen bedrust meer te houden.

De wond wordt gecontroleerd op nabloeden/ lekken.



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Ascitespuncite of ascitesdrainage
800386-NL / 2013-10