

Besnijdenis (circumcisie)

Chirurgie



Beter voor elkaar

Deze folder geeft u informatie over de besnijdenis (circumcisie). Bij een vernauwing van de voorhuid van de penis (phimosis) kan de voorhuid niet meer over de eikel worden teruggeschoven. Dit kan een medische reden zijn om tot een besnijdenis (circumcisie) te besluiten. Om geloofsredenen kan ook tot een besnijdenis worden besloten.

Folders voor kinderen:

- Uw kind op de Dagbehandeling (informatie voor ouders).
- Anesthesie (over pijnstilling en eten/ drinken voor de operatie)

Folders voor volwassenen:

- Welkom op de Dagbehandeling / Kort verblijf
- Anesthesie (over pijnstilling en eten/ drinken voor de operatie)

Scheren

- Het operatiegebied moet u **NIET** zelf scheren. Dit gebeurt op de operatiekamer. Zo wordt voorkomen dat er misschien kleine wondjes ontstaan bij het scheren die infectie kunnen veroorzaken. Voor de operatie moet u zich goed wassen/douchen met water en zeep. **GEEN** bodylotion / crème gebruiken!
- Voor de instructies over eten en drinken voor de operatie zie de folder 'Anesthesie' en de schriftelijke bevestiging voor de operatie.

De operatie

De ingreep wordt doorgaans in dagbehandeling uitgevoerd, meestal onder plaatselijke verdoving. Er worden dan twee injecties aan de basis van de penis gegeven. De gehele penis is daarmee tijdens de ingreep verdoofd. Bij kinderen wordt de ingreep ook wel onder algehele anesthesie (narcose) uitgevoerd.

Bij een besnijdenis (circumcisie) wordt de voorhuid een stuk ingekort. Gebeurt dat met een chirurgische ingreep dan wordt – na het losmaken en verwijderen van de voorhuid – het restant met oplosbare hechtingen vastgemaakt aan de rand van de eikel. Tegenwoordig wordt ook wel gebruik gemaakt van een soort ronde klem, die over de penis heen kan worden geschoven en op de voorhuid wordt geplaatst. De voorhuid wordt op die manier langzaam ‘afgeklemd’. Het plaatsen van deze klem gebeurt ook onder een plaatselijke verdoving.

Na de besnijdenis komt de eikel geheel bloot te liggen. Wanneer dat als behandeling wegens een vernauwing van de voorhuid (phimosis) niet de wens van de patiënt is, kan de arts een voorhuidplastiek doen, waarbij de voorhuid wijder wordt gemaakt.

Een besnijdenis (circumcisie) duurt ongeveer een halfuur. Na een tot twee uur raakt de verdoving uitgewerkt en komt het gevoel in de penis weer terug.

De ingreep bij een kind

Deze operatie gebeurt bij kinderen onder volledige anesthesie. Dit betekent dat uw zoon tijdens de operatie slaapt. De penis wordt na de verdoving gedesinfecteerd en de schaamstreek wordt met steriele doeken afgedekt. Tijdens de operatie wordt de voorhuid (gedeeltelijk) verwijderd. Rondom de basis van de eikel worden oplosbare hechtingen geplaatst. De operatie zelf duurt ongeveer 20 minuten. Het wondverband dat aan het einde van de operatie wordt aangebracht mag 24 uur blijven zitten. Als het verband eerder afvalt, mag de penis weer met een droog steriel gaasje verbonden worden. Het wondje zal na de operatie een beetje dragen. Probeer de penis na het wassen zo droog mogelijk te maken en te houden.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of wondinfectie. Gelukkig komen deze weinig voor.

U moet bij onderstaande klachten contact opnemen met het ziekenhuis:

- een nabloeding. Een klein beetje bloed is normaal na de operatie, maar als het bloed uit de wond blijft druppelen of de penis zwelt erg op, dan is dat niet normaal;
- toenemende pijnklachten die niet goed reageren op pijnstilling;
- problemen met plassen;
- koorts boven de 38,5°C.

Na de ingreep

Als de verdoving uitgewerkt is kunnen er wat pijnklachten zijn, waarvoor pijnstillers als paracetamol kunnen helpen. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is raadzaam om voor de ingreep alvast deze pijnstillers in huis te hebben.

Het plassen kan de eerste paar keer een branderig gevoel geven.

Dit verdwijnt bij doorplassen.

Het is verstandig om het op de dag van de ingreep wat rustig aan te doen.

Controleafspraak

Kinderen hoeven niet terug te komen op de polikliniek. Bij vragen of problemen kunt u uiteraard contact opnemen met de polikliniek Chirurgie of buiten kantoor tijden met de SEH (spoedeisende hulp).

Adviezen voor thuis

Kort na de ingreep kan de penis er gezwollen en blauwrood uitzien.

Dit verdwijnt in de loop van de week.

Het korter zijn van de voorhuid heeft geen invloed op de seksuele beleving.

Als de wond genezen is, is geslachtsgemeenschap weer mogelijk.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.

Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden.

Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met het ziekenhuis.

Tot slot

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag van u.

Polikliniek Chirurgie

T 010 297 52 20

Maandag tot en met vrijdag tussen 08.15 – 16.30 uur



Ikazia Ziekenhuis

Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Besnijdenis (Circumcisie), chirurgische folder
800421-NL / 2014-07