

Leefregels na CABG

bypassoperatie

Cardiologie



Beter voor elkaar

Na uw bypassoperatie heeft u waarschijnlijk veel vragen en krijgt u veel adviezen. In deze informatiefolder zetten we belangrijke leefregels voor u op een rij.

Deze folder is geschreven op basis van de brochure "Bypass- of omleidingsoperatie van de kransslagaders" van de Nederlandse Hartstichting, die u voor de operatie heeft ontvangen en met de folder "Informatie Poliklinische hartrevalidatie", die u van de verpleegkundige heeft ontvangen.

Heeft u één van deze folders nog niet in uw bezit, vraag ernaar op de verpleegafdeling.

Lees de informatie goed door en bewaar deze.

Lichamelijk herstel

Controleer uw borst- en beenwond dagelijks op roodheid, zwelling of andere eventuele irritatie. Neem bij pijn en/of verandering van de wond contact op met uw huisarts.

Als u een lichaamstemperatuur van 38.5°C of hoger heeft, eventueel in combinatie met roodheid/ zwelling van uw wond(en), is het verstandig om contact met uw huisarts op te nemen. Gebruik liever geen crème/ poeder of bodylotion op de wonden, zo voorkomt u dat de wond week wordt.

Als u een los draadje ziet, trek er dan niet aan! De hecht draad lost op in zes weken. Douchen mag, mits niet te lang. De wondranden kunnen door lang douchen week worden.

Pijn in nek, rug, schouders of borst is normaal. Aan de borstkas zitten veel spieren en pezen vast die we bij normale dagelijkse bewegingen gebruiken. Tijdens de operatie zijn deze ontwricht, dit kan de eerste weken te voelen zijn. Het is niet verstandig om de eerste weken zware dingen te tillen of veel kracht te gebruiken.

Medicijn gebruik

Het is belangrijk dat u al uw medicijnen trouw inneemt op de aangegeven tijdstippen.

Medicatie nooit stoppen/vermeerderen/verminderen zonder overleg met uw cardioloog of huisarts.

Nitroglycerine spray/tabletten kunnen de pijn op de borst klachten wegnemen. U dient deze altijd bij u te dragen. Nitroglycerine onder de tong ingenomen zorgt voor een directe vaatverwijding van meerdere vaten in uw lichaam. Hierdoor verdwijnt vrijwel direct de pijn op de borst klachten.

Als bijwerking kan nitroglycerine een vrijwel directe bloeddrukdaling geven, hierdoor kunt u duizelig worden. Daarom moet u altijd gaan zitten of liggen vóórdat u de spray/tabletten gebruikt.

Wanneer u de spray of tabletten maximaal 2x heeft gebruikt binnen een half uur bij herkenbare pijn op de borstklachten en de pijn is niet verminderd, neem dan contact op met de (dienstdoende) huisarts, of bel 112.

Beweging

Indien u een beenwond heeft moet u gedurende 6 weken een elastische kous dragen.

Het is belangrijk om te blijven bewegen, of om in beweging te komen.

Probeer elke dag iets aan lichaamsbeweging te doen, alle bewegingsvormen waarbij u nog gewoon kunt praten zijn goed. U moet dus niet buiten adem raken.

Wees de eerste weken voorzichtig met het maken van asymmetrische bewegingen. Dat wil zeggen dat wanneer u iets duwt, trekt of tilt, u dit het beste met beide armen tegelijk doet.

Autorijden, fietsen en reizen

U mag gedurende 6 tot 8 weken niet autorijden en niet fietsen. Dit heeft te maken met het feit dat u een flinke borst- (en soms been-) wond heeft en met de verzekering.

Wacht met fietsen en autorijden totdat u gestart bent met de hartrevalidatie. Overleg dit met uw fysiotherapeut.

Overleg met uw cardioloog wanneer u weer mag reizen per vliegtuig.

Roken

Wij adviseren u met klem het roken te staken. Ook als u lang gerookt heeft, is het zinvol om te stoppen.

In het Ikazia Ziekenhuis is er een "Stoppen met roken polikliniek", waar u persoonlijk begeleid wordt met het stoppen. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de polikliniek longziekten

T 010 297 53 60

Thuiszorgorganisaties bieden cursussen aan om te stoppen met roken, vaak in samenwerking met Stivoro (Stichting Volksgezondheid en Roken), meer informatie op www.stivoro.nl.

Dieet

Eet minder vet en gebruik minder zout.

Drink voldoende water en matig alcoholgebruik.

Werken

Wij raden u aan om goed naar uw lichaam te luisteren. Wanneer u een stressvolle baan heeft is het niet verstandig om na een hartoperatie meteen weer aan de slag te gaan.

Over het algemeen hanteren wij de regel dat u na de opname eerst gaat revalideren.

Na de revalidatie kunt u, in overleg met uw cardioloog, de fysiotherapeuten en de arbodienst betrokken bij uw werk, starten met een aantal ochtenden per week werken.

Dit kunt u in de loop van een aantal weken of maanden uitbreiden naar weer volledig werken.

De snelheid waarmee u weer volledig zult kunnen werken, hangt af van uw hartaandoening, uw conditie, de aard van uw werk en uw leeftijd.

Seksualiteit

Sommige patiënten of hun partners merken dat het vrijen anders gaat dan voorheen.

Dit kan komen doordat u nog erg moe bent, u nog erg bezig bent met de verwerking van uw ziekte en soms ook doordat u bang bent voor uw gezondheid. Wanneer u zonder problemen twee trappen kunt lopen, dat wil zeggen dat u geen pijn op borst krijgt, niet sterk kortademig wordt of hartkloppingen krijgt, is het veilig om ook weer gemeenschap te hebben. Sommige medicijnen ter verbetering van de werking van uw hartspeer, kunnen eveneens uw zin in seks verminderen of invloed hebben op uw erectie of op het vochtig worden van de vagina.

Wanneer u problemen heeft met seksualiteit neemt u dan contact op met uw cardioloog of uw huisarts.

Hartrevalidatie

In principe komt u in aanmerking voor hartrevalidatie. Tijdens de revalidatieperiode kunt u met deze vragen altijd terecht bij één van de teamleden hartrevalidatie.

Vragen over uw behandeling kunt u ook altijd voorleggen aan uw cardioloog.

Indien u voor uw ontslag nog geen contact heeft gehad met de coördinator hartrevalidatie en binnen 4 weken na ontslag geen bericht ontvangen heeft, kunt u zelf contact opnemen met de hartrevalidatie:

Telefonische bereikbaarheid:

Verpleegafdelingen Cardiologie

Afdeling 6A:	010 297 52 61
Afdeling 6B:	010 297 52 64
Afdeling Fysiotherapie:	010 297 54 80
Polikliniek Cardiologie:	010 297 52 10

De Nederlandse Hartstichting heeft een informatielijn voor vragen over hart- en vaatziekten (0900) 30 00 300 (van 10 tot 16 uur) zie ook www.hartstichting.nl

Algemene adresgegevens:

Ikazia Ziekenhuis

Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
T 010 297 50 00

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis

Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Bypassoperatie (CABG), leefregels na
800460-NL / 2012-08