

HSG hystero-salpingogram (foto van baarmoeder en eileiders)

Gynaecologie



Beter voor elkaar

Inleiding

Met een HSG, een röntgenfoto, kunnen de vormen van de baarmoeder en de eileiders zichtbaar worden gemaakt. Zo kan de doorgankelijkheid van de eileiders worden beoordeeld.

De foto wordt gemaakt aan het einde van de 1e week of aan het begin van de 2e week, na het begin van de menstruatie. We adviseren u om vanaf de menstruatie tot aan de HSG veilig te vrijen.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie.

Omdat het onderzoek voor sommige vrouwen zeer pijnlijk kan zijn, is het goed om een uur voor deze afspraak een pijnstillertje in te nemen. Dit zal met u worden afgesproken tijdens het polikliniekbezoek waar de HSG met u wordt besproken. Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn.

U wordt verzocht zich te melden, voordat de foto gemaakt wordt, bij de afdeling Radiologie op de 2e verdieping route nr. 37.

Neemt u iemand mee zodat u na afloop van de foto niet alleen naar huis hoeft te gaan. In verband met het onderzoek raden wij u aan een lang T-shirt te dragen.

Voor het maken van een afspraak belt u bij het begin van een menstruatie naar de polikliniek Gynaecologie van het Ikazia Ziekenhuis.

T 010 297 5240

Het onderzoek

Het onderzoek duurt niet langer dan twintig minuten. Een arts-assistent voert het onderzoek uit en de radioloog maakt de foto's. Tijdens het onderzoek kunnen ook een co-assistent van de gynaecologie en een radiologisch laborant (in opleiding) aanwezig zijn.

U ligt op een tafel met de benen in beensteunen. Er wordt een dunne katheter via de schede in de baarmoeder geplaatst. Er wordt contraststof (jodiumhoudend) door de katheter gespoten. Dit komt in de baarmoeder terecht en bereikt vervolgens de hogerop gelegen eileiders. Dit kan pijnlijk zijn.

De radioloog maakt een foto van de onderbuik: de baarmoeder en eileiders worden op deze manier afgebeeld. Na afloop wordt u de voorlopige beoordeling van de gemaakte foto verteld.

Tijdens de poliklinische controle, ongeveer drie weken later, krijgt u van uw behandelend arts de definitieve uitslag te horen.

Bent u allergisch voor jodium? Geef dit voor het onderzoek bij uw behandelend arts aan.

Thuis

U kunt na het onderzoek last hebben van de volgende verschijnselen:

- *Vaginaal bloedverlies*

Is onschuldig, duurt enkele dagen en gaat over in bruine afscheiding;

- *Buikpijn*

Kan een dag "zeurend" aanwezig blijven maar verdwijnt meestal snel na het maken van de foto.

- *Koorts*

Als u koortsverschijnselen heeft neem dan contact op met de polikliniek.

Ten slotte

Heeft u nog vragen, belt u dan de polikliniek Gynaecologie van het Ikazia Ziekenhuis, van maandag t/m vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur:

T 010 297 52 40

Op alle andere tijden kunt u bellen naar het algemene nummer van het Ikazia Ziekenhuis:

T 010 297 50 00

www.ikazia.nl



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.