

Beenmergpunctie

Interne geneeskunde



Beter voor elkaar

Beenmergpunctie

De vorming van bloedcellen vindt bij een volwassene plaats in het beenmerg. Beenmerg bevindt zich voornamelijk in het bekken en het borstbeen.

Om beenmerg voor onderzoek te verkrijgen kan gebruik gemaakt worden van 2 methoden, die hieronder beschreven worden.

Bij de eerste methode wordt alleen beenmerg opgezogen (te vergelijken met bloed).

Bij de tweede methode zuigt je niet alleen beenmerg op, maar haal je ook een klein pijpje bot weg, waartussen zich dan het beenmerg bevindt.

Beenmergpunctie zonder bot

De punctie wordt uitgevoerd vanuit het bekken. Hiervoor ligt u op uw zij, met opgetrokken benen.

De arts zal de plek van de punctie eerst schoonmaken met alcohol, waarna hij plaatselijk zal verdoven.

Als de verdoving is aangebracht en de huid niet meer gevoelig is, prikt hij in het bekken en zuigt vervolgens met een spuit het beenmerg op. Het opzuigen van het beenmerg is pijnlijk, dit kan namelijk niet verdoofd worden. Het kan een kort stekend gevoel geven.. Na het opzuigen van het beenmerg ligt u, afhankelijk of het wondje nabloedt, nog een minuut of 10 tot 30 op uw rug.

Hierna is het onderzoek afgerond en zal de assistente het wondje verbinden met een pleister. Deze kunt u er in de loop van de dag afhalen.

Over het algemeen zult u na het onderzoek geen klachten ondervinden.

Mocht het wondje toch een beetje gevoelig zijn, dan kunt u een Paracetamol tablet nemen.

U zult na 1 à 2 weken een afspraak op de polikliniek krijgen voor de uitslag van het onderzoek.

Beenmergpunctie met bot

Het principe is hetzelfde als bij een beenmergpunctie zonder bot, maar bij dit onderzoek wordt er ook een biopt (stukje bot) uit het bekken gedaan. Onder plaatselijke verdoving wordt het bot aangeprikt, waarna de arts het beenmerg opzuigt. Hierna wordt ook het biopt uit het bot genomen. Met het nemen van het botbiopt is het onderzoek afgerond, en is de begeleiding verder hetzelfde als na een punctie zonder botbioptie.

Gebruikt u antistolling medicatie zoals Acenocoumarol, Marcoumar, Ascal of Plavix overleg dan voor het onderzoek met uw specialist.

Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u van maandag tot en met vrijdag bellen tussen 8.15 – 16.30 uur met

T 010 297 52 50

polikliniek Inwendige Geneeskunde

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Beenmergpunctie
800514-NL / 2013-10