

ADP infuus

Interne geneeskunde



Beter voor elkaar

Er is voor u een afspraak gemaakt voor een behandeling met APD. Via deze brochure informeren wij u over de behandeling met APD via een infuus.

- *Wat is APD*

APD is Pamidronaat wat wordt toegepast voor de behandeling van osteoporose (botontkalking) en botmetastasen (kanker met uitzaaiingen in de botten). Het gaat voornamelijk om patiënten met pijnklachten. Pijnklachten worden veroorzaakt botbreuken of wervelinzakkingen. APD wordt meestal één maal per vier weken gegeven via een infuus. Voor de indicatie osteoporose maximaal vier keer per jaar, met tussenpozen van drie maanden. Dit voornamelijk omdat deze medicatie via een tablet niet wordt verdragen. APD voor de indicatie botuitzaaiingen mag maximaal twee maal jaar gegeven worden.

U krijgt 60 mg APD per keer bij osteoporose, of 90 mg APD per keer bij botuitzaaiingen.

- *Vorbereiding*

Voor het infuus zijn geen voorbereidingen van toepassing.

U wordt wel verzocht om een overzicht mee te nemen van wat u aan medicijnen gebruikt en eventuele allergieën te melden. Graag bij de 1e opname medicijnen in originele verpakking meenemen zodat de verpleegkundige deze kan noteren.

- *Het infuus*

U moet zich op de afgesproken tijd melden bij de informatiebalie in de hal van het ziekenhuis. Daarna wordt u met uw papieren door een van onze vrijwilligers naar de afdeling gebracht.

Daar heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige en wordt het infuus ingebracht.

- *Duur van de behandeling*

De behandeling duurt minimaal 2 uur. Als u voor de eerste keer komt wordt de medicatie iets langzamer toegediend (ongeveer 3 uur).

Tijdens de behandeling zit u in een gemakkelijke stoel of ligt u in bed.

Het is niet nodig om nachtkleding mee te nemen.

Het is toegestaan dat u begeleid wordt door 1 persoon mits het niet storend is voor andere patiënten.

- *Na de behandeling*

Als de behandeling is afgelopen wordt het infuus door de verpleegkundige verwijderd en kunt u weer naar huis gaan.

- *Mogelijke bijwerkingen*

Als er al bijwerkingen zijn kunnen die bestaan uit temperatuursverhoging.

Dit uit zich meestal een dag na de infusie in een griepig gevoel.

Mocht u koorts blijven houden, neem dan contact op met uw huisarts.

Zeer zeldzame bijwerkingen: versterf van het bot in het kaakbeen, vandaar dat de APD maar enkele keren per jaar gegeven mag worden.

Geadviseerd wordt voor de start met APD het gebit goed te saneren.

Geeft u dit bij de volgende behandeling ook door aan de verpleegkundige.

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige stellen.

T 010 297 58 54

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

APD infuus
800515-NL / 2013-10