

Botox injectie van de blaas

polikliniek Urologie



Beter voor elkaar

Botox injectie therapie van de blaas

Inleiding

Uw behandelend arts heeft bij u de diagnose 'overactieve blaas' gesteld. Dit betekent dat u vaak moet plassen en dat het plassen meestal vooraf wordt gegaan door hevige aandrang. Zelfs kan het zo zijn dat u af en toe de urine niet kunt ophouden. Hiervoor hebt u al verschillende behandelingen gehad met bijvoorbeeld medicijnen of bekkenbodemp therapie. Als geen van deze behandelingen voldoende helpt, kan de toediening van botuline-toxine (botox) uitkomst bieden. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben stel deze dan aan uw behandelend arts en verpleegkundige.

Behandeling

Voor het juiste effect moet botox direct in de blaasspier gespoten (geïnjecteerd) worden en wel op 30 plaatsen in de blaas. Hiervoor gebruikt de uroloog een lange injectienaald die door een cystoscoop op de juiste plaatsen wordt geprikt. Op elk van die 30 plaatsen wordt een zeer kleine hoeveelheid botox geïnjecteerd. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Een uur voor de ingreep wordt via een eenmalige katheter verdovingsvloeistof in de blaas gebracht.

Wat kunt u van de ingreep verwachten

De behandeling geeft geen nare neveneffecten. Soms kan na injectie de urine iets bloederig zijn. Drinkt wat extra na de behandeling.

Als u spontaan geplast hebt, mag u naar huis. Het effect van de behandeling is na ongeveer drie dagen te merken. Helaas werkt botox maar drie tot twaalf maanden. Als het is uitgewerkt kan de behandeling herhaald worden. Een ander nadeel is dat bij sommige patiënten de botox zó goed werkt, dat zij enige tijd niet goed kunnen plassen en daarom zichzelf enkele malen per dag moeten katheteriseren. Als u merkt dat u regelmatig kleine hoeveelheden plast of het gevoel heeft niet leeg te plassen, neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie. In het weekend of in de avond met de SEH, spoedeisende hulp.

Als u twijfelt of u zelf katheteriseren wel aankunt of aandurft, dan krijgt u de mogelijkheid dit te leren vóór dat de ingreep wordt uitgevoerd.

Vragen

Deze folder geeft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met de uroloog. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met polikliniek Urologie bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.00 uur

Polikliniek Urologie (route 11)

T 010 297 54 50

Urologieverpleegkundige

T 010 297 53 46

SEH

T 010 297 53 00

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Blaas, Botox injectie van de
800587-NL / 2014-07