

Histamineprovocatietest

Longziekten



Beter voor elkaar

Histamineprovocatietest

Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een histamineprovocatietest. Deze test geeft belangrijke informatie over de gevoeligheid (prikkelbaarheid) van de luchtwegen.

De test vindt plaats op de polikliniek longziekten. **Tijdens dit onderzoek is het niet mogelijk dat er naast de patiënt en de longfunctieanalist andere personen in de behandelkamer aanwezig zijn.** (Dit vanwege de verneveling met Histamine oplossingen)

Wij verzoeken u vriendelijk tijdig aanwezig te zijn.

Vorbereiding

Neem uw longmedicatie of een recent medicatieoverzicht van de apotheek mee, zodat de longfunctieanalist weet welke medicijnen u gebruikt.

Om dit onderzoek te doen slagen, is het van belang dat u tijdig **stopt met uw longmedicatie en antihistaminica** (medicatie voor allergie). Raadpleeg de lijst met stakingsvoorschriften die in deze folder staat. Hierin kunt u nalezen hoe lang u met uw longmedicatie en antihistaminica van tevoren moet te stoppen. Gebruikt u longmedicatie die niet in deze lijst voorkomt, dan kunt u deze blijven gebruiken.

Let op! Als u de longmedicatie en antihistaminica niet staakt, kan het onderzoek niet worden uitgevoerd.

Heeft u vragen over dit onderzoek of de informatie in de folder, dan kunt contact opnemen met de polikliniek Longziekten.

Lijst stakingsvoorschriften longmedicatie

Aantal uren van te voren staken	Merksnaam longmedicatie	Generieke naam longmedicatie
4 uren	Atrovent	Ipratropium
12 uren	Ventolin Aerolin Autohaler Airomir Berodual Berotec Combivent Seretide Serevent Singulair Semprex	Salbutamol Salbutamolhemisulfaat Salbutamol Fenoterol+Ipratropium Fenoterol Salbutamol + Ipratropium Salmeterol + Fluticason Salmeterol Montelukast Acrivastine
24 uren (= 1 dag)	Atimos Bricanyl Duaklir Genuair Eklira Genuair Relvar Ellipta Flutiform Foradil Foster Oxis Symbicort Unilair Theolair Retard	Formeterol Terbutaline Aclidinium + Formeterol Aclidinium Fluticasonfuroaat/vilanterol Formeterol + Fluticason Formoterol Formoterol + Beclometason Formoterol Formoterol + Budesonide Theofylline Theofylline

Lijst stakingsvoorschriften longmedicatie (vervolg)

Aantal uren van te voren staken	Merknaam longmedicatie	Generieke naam longmedicatie
48 uren (= 2 dagen)	Anoro	Umeclidinium/vilanterol
96 uren (= 4 dagen)	Daxas Onbrez Seebri Spiriva Striverdi Spiolto Ultibro	Roflumilast Indacaterol Glycopyrronium Tiotropium Olodaterol Tiotropium/Olodaterol Indacaterol/glycopyrronium

Lijst stakingsvoorschriften antihistaminica

Aantal uren van te voren staken	Merknaam antihistaminica	Generieke naam antihistaminica
24 uren (= 1 dag)	Xyzal Zyrtec	Levocetirizine Cetirizine
36 uren (= 1,5 dag)	Mizollen Promethazine Telfast	Mizolastine Promethazine Fexofenadine
72 uren (=3 dagen)	Aerius Allerfre Claritine Tavegil Tinset	Desloratadine Loratadine Loratadine Clemastine Oxatomide

Het onderzoek

Voor de test krijgt u van de longfunctieanalist uitgebreide informatie over het verloop van de test.

Tijdens het onderzoek ademt u via een mondstuk aan het longfunctieapparaat. Hierbij heeft u een klemmetje op de neus om te voorkomen dat u via de neus ademt.

Aan het begin van de test wordt een aantal keer een oefening geblazen om uw longfunctie te meten. Daarna inhaleert u met tussenpozen verschillende histamineoplossingen. Na iedere oplossing wordt de longfunctie gemeten. Aan de hand van de meetresultaten kan worden vastgesteld of astmatische klachten (hoesten en/of benauwdheid) kunnen worden opgewekt.

Tijdens de test kunt u een benauwdheidsreactie krijgen, mocht dat zo zijn, dan krijgt u van de longfunctieanalist een luchtwegverwijdend middel toegediend waarmee de reactie binnen enkele minuten ongedaan wordt gemaakt. Daarna blaast u nogmaals de oefening, om te beoordelen of de longfunctie weer normaal is geworden.

Door het onderzoek kunt u wat hees/schor worden, ook kunt u nog even last houden van hoesten. U kunt ook lichte irritatie in de keel ervaren door het vele blazen. Deze klachten zijn onschuldig en gaan vanzelf binnen uren na de test weer over.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt minimaal 45 minuten en maximaal 90 minuten.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek tijdens uw volgende afspraak op de polikliniek bij de longarts.

Tot slot

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op de informatie die u van de longarts en/of doktersassistente heeft gekregen. U kunt dan thuis alles nog eens rustig doorlezen. Wanneer u vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan de longarts of longfunctieanalist.

Wat te doen wanneer u ziek of verhinderd bent

- Wanneer u verhinderd bent, laat het ons dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten;
- Wanneer u vertraging heeft opgelopen en niet tijdig aanwezig kunt zijn, laat het ons dan weten;
- Wanneer u niet tijdig afbelt voor het onderzoek of niet komt zonder bericht worden er kosten in rekening gebracht.

T 010 297 53 60

Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.