

Histamineprovocatietest

Longgeneeskunde



Beter voor elkaar

Histamineprovocatietest

Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een histamineprovocatietest. Deze test geeft belangrijke informatie over de gevoeligheid (prikkelbaarheid) van de luchtwegen.

De test vindt plaats op de polikliniek longgeneeskunde. **Tijdens dit onderzoek is het niet mogelijk dat er naast de patiënt en de longfunctieanalist andere personen in de behandelkamer aanwezig zijn.**

(Dit vanwege de verneveling met Histamine oplossingen)

Wij vragen u vriendelijk op tijd aanwezig te zijn.

Vorbereiding

Voor het onderzoek is het belangrijk dat u 1 uur van tevoren geen zware activiteiten doet of rookt.

Om dit onderzoek te doen slagen, is het van belang dat u tijdig **stopt met uw longmedicatie en antihistaminica** (medicatie voor allergie). Bekijk de lijst met stakingsvoorschriften die in deze folder staat. Hierin kunt u nalezen hoe lang u met uw longmedicatie en antihistaminica van tevoren moet stoppen. Gebruikt u longmedicatie die niet in deze lijst voorkomt? Bel dan met de polikliniek longgeneeskunde.

Let op! Als u de longmedicatie en antihistaminica niet stopt, kan het onderzoek niet worden gedaan.

Heeft u vragen over dit onderzoek of de informatie in de folder? Bel dan met de polikliniek Longgeneeskunde.

Lijst stakingsvoorschriften longmedicatie

Aantal uren van te voren stoppen	Merksnaam longmedicatie	Generieke naam longmedicatie
12 uren	Atrovent Ventolin Aerolin Autohaler Airomir Berodual Berotec Combivent Bricanyl	Ipratropium Salbutamol Salbutamolhemisulfaat Salbutamol Fenoterol+Ipratropium Fenoterol Salbutamol + Ipratropium Terbutaline
24 uren (= 1 dag)	Seretide Serevent Singulair Semprex Atimos Duaklir Genuair Eklira Genuair Relvar Ellipta Flutiform Foradil Foster Oxis Symbicort Unilair Theolair Retard	Salmeterol + Fluticason Salmeterol Montelukast Acrivastine Formeterol Acclidinium + Formeterol Acclidinium Fluticasonfuroaat/vilanterol Formeterol + Fluticason Formoterol Formoterol + Beclometason Formoterol Formoterol + Budesonide Theofylline Theofylline
48 uren (=2 dagen)	Daxas Onbrez	Roflumilast Indacaterol

96 uren (= 4 dagen)	Anoro Seebri Spiriva Stiverdi Spiolto Ultibro Trimbow Trelegy Bevespi	Umeclidinium/vilanterol Glycopyrronium Tiotropium Olodaterol Tiotropium/Olodaterol Indacaterol/Glycopyrronium Beclometason/Formoterol/ Glycopyrronium Fluticason/Umeclidinium/ vilanterol glycopyrronium/formoterol
------------------------	---	---

Het is niet nodig te stoppen met Qvar, Flixotide, pulmicort of Alvesco

Lijst stakingsvoorschriften longmedicatie (vervolg)

Aantal uren van te voren stoppen	Merknaam longmedicatie	Generieke naam longmedicatie
96 uren (= 4 dagen)	Anoro Seebri Spiriva Striverdi Spiolto Ultibro	Umeclidinium/vilanterol Glycopyrronium Tiotropium Olodaterol Tiotropium/Olodaterol Indacaterol/glycopyrronium

Lijst stakingsvoorschriften antihistaminica

Aantal uren van te voren stoppen	Merknaam antihistaminica	Generieke naam antihistaminica
72 uren (=3 dagen)	Aerius Allerfre, Claritine Hydroxyzine Cinnarizine Cylizine Emesafene Kestine Promethazine Reactine, Zyrtec,prevalin Semprex Suprimal Tavegyl Tinset Telfast Xyzal Nedeltran Mizollen Rupafin Primatour Toplexil	Desloratadine Loratadine Hydroxyzine Cinnarizine Cyclizine Meclozine/Pyridoxine Ebastine Promethazine Cetirizine Acrivastine Meclozine Clemastine Oxatomide Fexofenadine Levocetirizine Alimenazine Mizolastine Rupatadine Chloorcyclizine/Cinnarizine Oxomemazine

Het onderzoek

Voor de test krijgt u van de longfunctieanalist uitgebreide informatie over hoe de test werkt.

Tijdens het onderzoek ademt u via een mondstuk aan het longfunctieapparaat. Hierbij heeft u een klemmetje op de neus om te voorkomen dat u via de neus ademt.

Aan het begin van de test wordt een aantal keer een oefening geblazen om uw longfunctie te meten. Daarna ademt u met korte pauzes histamineoplossingen in. Na iedere oplossing wordt de longfunctie gemeten.

Tijdens de test kunt u een benauwdheidsreactie krijgen, mocht dat zo zijn, dan krijgt u van de longfunctieanalist een luchtwegverwijdend middel toegediend waarmee de reactie binnen enkele minuten ongedaan wordt gemaakt. Daarna blaast u nogmaals de oefening, om te beoordelen of de longfunctie weer normaal is geworden.

Door het onderzoek kunt u wat hees/schor worden en kunt u nog even last houden van hoesten. U kunt ook lichte irritatie in de keel ervaren door het vele blazen. Deze klachten zijn onschuldig en gaan vanzelf binnen uren na de test weer over.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt minimaal 45 minuten en maximaal 90 minuten.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek tijdens uw volgende afspraak op de polikliniek bij de longarts.

Tot slot

Mocht het zo zijn dat u in de toekomst een controle longfunctie onderzoek moet ondergaan, dan mag u uw medicatie als normaal doorgebruiken. Bij twijfel neem contact op met de polikliniek longgeneeskunde.

Deze informatie is bedoeld als extra op de informatie die u van de longarts en/of doktersassistente heeft gekregen. U kunt dan thuis alles nog eens rustig doorlezen. Wanneer u vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan de longarts of longfunctieanalist.

Wat te doen wanneer u ziek bent of niet kunt komen

- Als u niet kunt komen, laat het ons dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten;
- Als u vertraging heeft opgelopen en niet op tijd kunt zijn, laat het ons dan weten;
- Als u niet op tijd afbelt voor het onderzoek of niet komt zonder dit te laten weten dan krijgt u een rekening thuis gestuurd.

T 010 297 53 60

Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.