

# Varicocèle

Onderbinden van een spatader in de balzak

Urologie




Beter voor elkaar

## Inleiding

Een spatader in de balzak (scrotum) wordt een varicocèle genoemd. In de balzak bevinden zich meerdere aders die bloed afvoeren van de testikel naar de buik. Terugstromen van bloed wordt voorkomen door klepjes in de aders. Spataders zijn uitgezette aders, waarbij de kleppen niet goed functioneren. Dit wordt meestal veroorzaakt door drukverhoging in de bovenliggende aders. In deze folder wordt beschreven wat varicocèle is en hoe het behandeld wordt.

## Varicocèle

De varicocèle bevindt zich meestal links in de balzak. Dit komt doordat de linker ader een vrij lang verloop heeft en uitmondt in de linker nierader. Drukverhoging in deze nierader kan het gevolg zijn van uitwendige druk op de ader door de grote lichaamsslagader (aorta) en een grote darmslagader. Hierdoor stroomt het bloed terug naar de testikel en veroorzaakt een temperatuursverhoging en een verminderde afvoer van afvalstoffen uit de testikel. Deze omstandigheden zijn nadelig voor uw spermaproductie en kunnen ook een kleinere testikel tot gevolg hebben. Een varicocèle wordt gevonden bij tien procent van de mannen.



## **Behandeling**

De operatie van de varicocèle vindt plaats onder narcose of ruggenprik. Het is een kortdurende ingreep, waarbij net boven de lies, in de buik, de ader wordt opgezocht en afgebonden. Uw herstel na de operatie bedraagt ongeveer een week. De resultaten van de operatie zijn goed: de kans op een terugkerende varicocèle na de ingreep is slechts vijf procent.

## **Nazorg**

De eerste week na de operatie is het verstandig geen zware inspanning te leveren omdat dit de wondgenezing kan verstoren. Lichte bezigheden kunnen wel worden uitgevoerd. Enige pijn aan de wond kunt u meestal met eenvoudige pijnstillers (paracetamol) bestrijden. Een varicocèle kan, zoals gezegd, een verminderde testikelfunctie veroorzaken. Gevolg hiervan is een verminderde vruchtbaarheid. Na behandeling van de varicocèle herstelt de functie van de testikel zich geheel of gedeeltelijk en wordt verdere achteruitgang voorkomen. Het herstel van de testikelfunctie is pas na drie tot zes maanden merkbaar, spermacontrole is pas na deze periode zinvol.

## **Controle**

Volgens afspraak komt u op controle bij de uroloog. Indien u door ziekte of een andere reden verhinderd bent om op de afspraak te komen, neem dan contact op met de polikliniek Urologie.

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u contact opnemen met polikliniek Urologie. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30–16.00 uur.

### **Polikliniek Urologie (route 11)**

T 010 297 54 50

### **Urologieverpleegkundige**

T 010 297 53 46



**Ikazia Ziekenhuis**  
Montessoriweg 1  
3083 AN Rotterdam  
[www.ikazia.nl](http://www.ikazia.nl)

Balzak, onderbinden spatader in (Variocel)  
800648-NL / 2012-09