

Mesalazine bij colitis ulcerosa

Maag-Darm-Levercentrum



Beter voor elkaar

Mesalazine bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

De maag-darm-leverarts (MDL-arts) heeft samen met u besloten om u te behandelen met 5-asa/mesalazine. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in geval van een vergeten dosis en bijwerkingen. Het is echter géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend MDL-arts of – verpleegkundige terecht.

Algemeen

Tot nu toe is de oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziekte voor kunnen doen. De ziekte geneest niet door de behandeling met medicijnen. Na het afbouwen van of stoppen met deze medicijnen kunnen de klachten weer terugkomen.

Hoe werkt het?

Mesalazine wordt gebruikt bij ontstekingen van de dunne en dikke darm. Nadat mesalazine is ingenomen komt het via de maag in de darm terecht. De werkzame stoffen komen vrij in de dunne darm. De werking treedt geleidelijk in.

Mesalazine wordt niet alleen gebruikt om een ontsteking tot rust te brengen maar ook om nieuwe ontstekingen te voorkomen. Mesalazine is bekend onder de volgende merknamen: Pentasa[®], Claversal[®], Asacol[®], Salofalk[®], Sulfasalazine[®] en Salazopirine[®].

Hoe wordt het gebruikt?

Mesalazine is verkrijgbaar in tabletten van 250 of 500 mg en is ook in de vorm van zetpillen, klysma en granulaat verkrijgbaar. Een gebruikelijke dosis is 3 x 2 tabletten van 500 mg per dag, maar tegenwoordig wordt mesalazine vaker 1 tot 2 keer daags gedoseerd.

Uw behandelend arts kan in bepaalde omstandigheden echter een hogere of lagere dosis voorschrijven.

Inname medicatie

Om bijverschijnselen zo veel mogelijk te beperken kunt u de tabletten het beste tijdens de maaltijd innemen. Slik de tabletten met water in hun geheel door.

Bijwerkingen

Mesalazine heeft in het algemeen weinig bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:

- huiduitslag, jeuk;
- misselijkheid/braken;
- buikpijn;
- diarree;
- haaruitval;
- duizeligheid, hoofdpijn;
- stemmingsveranderingen;
- nierfunctiestoornis (zeldzaam).

Heeft u last van een mogelijke bijwerking, raadpleeg dan altijd uw behandelend arts.

Let op! U merkt zelf niets bij een nierfunctiestoornis. Daarom zal uw arts uw bloed regelmatig controleren.

Vaccinaties

Mesalazine is niet van invloed op de werking van vaccinaties.

Zwangerschap / vruchtbaarheid / borstvoeding

Mesalazine is niet van invloed op de vruchtbaarheid van man en vrouw. Voor zover tot nu bekend, kan mesalazine tijdens de zwangerschap veilig worden gebruikt.

Overleg wel altijd met uw behandelend arts als u een zwangerschap overweegt. Mesalazine kan in beperkte mate worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding. Overleg hierover altijd met uw behandelend arts. Heeft u acute klachten, neem dan contact op met uw huisarts. De huisarts kan zonodig met uw behandelend arts overleggen.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u via mail of telefoon contact opnemen met de MDL-verpleegkundigen.

Voor het maken van afspraken neemt u contact op met het Maag- Darm- Levercentrum:

T 010 297 53 74

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:15 uur tot 16:30 uur.



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Mesalazine bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa
800684-NL / 2015-09