

Ganglion Stellatum (rhizotomie)

Polikliniek Pijnbestijding



Beter voor elkaar

Ganglion Stellatum (rhizotomie)

De specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten om tot een zenuwwortelblokkade over te gaan. Ongeveer twee weken voor de behandeling ontvangt u een schriftelijke oproep.

In deze brochure vindt u informatie over de behandeling, die kan bestaan uit een proefblokkade, of een definitieve zenuwblokkade.

Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan de specialist of verpleegkundige.

www.ikazia.nl

Algemeen

De behandeling vindt plaats op de operatiekamer.

Het doel van de behandeling is de zenuw die de pijnprikkel geleidt zodanig te behandelen dat de pijnprikkel niet meer kan worden doorgegeven aan de hersenen.

De specialist probeert vast te stellen door een proefblokkade (plaatselijke verdoving) welke zenuw de pijn geleidt.

Na een geslaagde (positieve) proefblokkade zal de pijn tijdelijk verminderen.

Nadat de pijngeleidende zenuw is opgespoord kan een definitieve zenuwblokkade worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan door elektrische pulsen. Een definitieve zenuwblokkade kan langere tijd pijnvermindering geven en zo nodig worden herhaald.

Ligging van de zenuwwortel

Zenuwwortels komen uit de openingen in de wervelkolom, tussen de wervels door op iedere hoogte van de wervelkolom.

De indicatie is:

- pijn in de nek uitstralend naar schouder, arm, hand of vingers
- patiënt met dystrofie

Vorbereiding

De behandeling gebeurt in dagopname.

Dit betekent dat u zich op de dag van de behandeling bij de Opname komt melden, waarna u naar de dagopname afdeling wordt gebracht.

Hier krijgt u een bed en een blauw operatiejack wat u aan trekt. Het kan zijn dat u nog even moet wachten voor u aan de beurt bent.

Daarna wordt u naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling gebracht.

Behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op de rug, met de nek iets overstrekt.

Met behulp van een injectie wordt er via de hals bij een zenuwknopje van het Ganglion Stellatum een medicijn achter gelaten.

Deze ingreep gaat onder röntgendoorlichting, om de juiste plaats voor injectie te bepalen. Bij de definitieve behandeling wordt er een naald via de hals geplaatst bij het zenuwknopje. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Vervolgens word na de verdoving elektrische pulsen gegeven.

Na de behandeling gaat u terug naar de voorbereidingsruimte, waar u nog even kan herstellen van de behandeling.

Daarna gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling en wanneer alles goed is mag u naar huis.

Houdt u rekening met het volgende:

- u mag niet alleen naar huis of zelf autorijden;
- na een zenuwblokkade kan er napijn optreden;
- men kan hees zijn, slikklachten hebben of wazig zien, of het ooglid kan tijdelijk een beetje gaan hangen;
- er kan tijdelijke krachtsvermindering voorkomen;
- bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen, graag voordat de afspraak gemaakt wordt overleggen met de arts;
- bij zwangerschap of koorts kan de behandeling niet doorgaan.



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Ganglion Stellatum
800706-NL / 2012-09