

Implanteerbare looprecorder (ILR)

Cardiologie



Beter voor elkaar



Een ILR is een kleine implanteerbare hartritmemonitor. Deze kan gegevens opslaan over uw hartritme die later beoordeeld kunnen worden. De ILR is 19,5 mm breed, 61 mm lang en 7 mm dik.

Een van de cardiologen, niet altijd uw eigen cardioloog, gaat bij u een ILR implanteren. Deze wordt onderhuids 5 tot 10 cm onder het linker sleutelbeen ingebracht.

Vóór het inbrengen van de ILR wordt de exacte plaats bepaald en afgetekend. U wordt eerst plaatselijk verdoofd door middel van een injectie. Er wordt dan een kleine opening gemaakt waar de ILR in kan. Met enkele hechtinkjes wordt de ILR vastgezet. De huid wordt weer gesloten. Dit kan met hechtingen die door de huisarts verwijderd moeten worden of door hechtingen die vanzelf oplossen. Dit wordt bepaald door de arts die de ILR inbrengt.

Over het wondje wordt een pleister geplakt. U mag gewoon douchen, wel de pleister even droog maken.

Na de implantatie krijgt u uitleg hoe u de ILR moet activeren. Het zou fijn zijn als er bij deze uitleg een partner of familielid aanwezig kan zijn, zodat meerdere personen geïnformeerd zijn met betrekking tot het activeren van de ILR.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, stelt u deze gerust.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur bereikbaar

T 010 297 52 10

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

ILR Implanterbare looprecorder
800748-NL / 2012-08