

Tetanus

Spoedeisende Hulp



Beter voor elkaar

Inleiding

U heeft van de Spoedeisende hulp (SEH) – verpleegkundige een tetanusinjectie gekregen. In deze folder leest u meer informatie over tetanus.

Uw tetanusvaccinatie.

Het is belangrijk dat u dit schema bewaart zodat u bij een volgend bezoek aan een arts kunt vertellen of u nog voldoende beschermd bent tegen tetanus.

De aangekruiste situatie is op u van toepassing:

- U bent volledig gevaccineerd tegen tetanus, maar de laatste D(K)TP–injectie of injectie met vaccin (tetanustoxoïd) heeft langer dan tien jaar geleden plaatsgevonden.

Om weer voldoende antistoffen op te bouwen krijgt u éénmalig een injectie met vaccin (tetanustoxoïd).

Datum injectie (tetanustoxoïd):

.....

- U bent volledig gevaccineerd tegen tetanus, maar:

U bent man en geboren vóór 1936

of

U bent vrouw en geboren vóór 1950

U krijgt éénmalig een injectie met antistoffen tetanusimmunoglobuline) en éénmalig een injectie met vaccin (tetanustoxoïd).

Datum injecties (tetanusimmunoglobuline en tetanustoxoïd):

.....

- U heeft in het verleden niet alle D(K)TP–injectie gekregen of het is niet bekend of u alle injecties gehad heeft. Advies is volledige vaccinatie;

of

- U bent nooit gevaccineerd. U krijgt een injectie met antistoffen (tetanusimmunoglobuline) en een injectie met vaccin (tetanustoxoïd). Om te zorgen dat het lichaam voldoende antistoffen aanmaakt, zijn nog twee injecties met vaccin (tetanustoxoïd) nodig, namelijk ongeveer één maand en zeven maanden na de eerste injectie;

of

- U bent volledig gevaccineerd tegen tetanus, maar u bent HIV positief of immuno–incompetent;

De eerste twee injecties krijgt u op de Spoedeisende Hulp van het Ikazia Ziekenhuis. De laatste twee injecties worden door uw huisarts gegeven. U krijgt hiervoor een recept mee, waarop de twee ampullen tetanus-toxoid zijn voorgeschreven. De ampullen dient u in de koelkast te bewaren.

Vaccinatieschema

Tetanus-immunoglobuline + tetanusvaccin (1e)

datum:

Tetanus vaccin (2e) na ongeveer één maand

datum:

Tetanus vaccin (3e) na ongeveer zes maanden na de tweede injectie

datum:

Het is belangrijk dat u het voorgeschreven vaccinatieschema (zie hierboven) helemaal afmaakt, omdat anders geen optimale bescherming tegen tetanus ontstaat.

Hoe lang is mijn vaccinatie geldig?

De vaccinatie beschermt u voor een periode van tien jaar.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie zijn pijn en/of roodheid op de injectieplaats.

Verder kunt u huiduitslag, jeuk, koorts, gewrichtspijn of een algeheel gevoel van ziek zijn krijgen. Overgevoelighedsreacties kunnen optreden.

Als de klachten na 24 uur niet verdwijnen kunt u contact opnemen met de huisarts.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of met de afdeling Spoedeisende Hulp te bereiken op nummer 010 2975300.

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Tetanus
800786-NL / 2013-12