

Injectie met Lidocaïne en Kenacort

Orthopedie



Beter voor elkaar

Inleiding

Samen met uw behandelend specialist heeft u besloten om u te laten behandelen met een injectie met lidocaïne en kenacort. In deze folder geven wij u meer informatie over deze injectie.

Waarom een injectie met lidocaïne en kenacort

Bij diverse aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat kan het zinvol zijn een injectie met lidocaïne en kenacort te geven. Met de twee werkzame stoffen van deze injectie bereiken we het volgende:

- Lidocaïne is een verdovingsmiddel met een pijnstillende werking;
- Kenacort is een corticosteroid met een ontstekingsremmende werking die de zwelling vermindert.

De injectie onderdrukt de ontstekingsreactie in de weefsels en vermindert zo de pijn en de zwelling.

Het ontstekingsremmende effect kan na 2 á 3 dagen beginnen, maar soms pas na enkele weken. De duur van het effect varieert van enkele weken tot langdurig.

De lidocaïne (verdooving) werkt meestal gelijk. De verdooving houdt 2 tot 3 uur aan.

Mogelijke bijwerkingen van de injectie

- De pijnklachten kunnen als reactie op de injectie verergeren; voornamelijk de eerste 2 á 3 dagen. Soms ontstaat wat zwelling en warmte op de plek waar de prik is gegeven. Een pijnstillend middel, zoals paracetamol 500 mg 4 tot 6 tabletten per dag of een ice-pack kan verlichting geven.
- Uw gezicht kan wat rood kleuren; dit is tijdelijk en verdwijnt meestal na enkele dagen.
- U kunt hormonale schommelingen hebben, waardoor menstruatiestoornissen kunnen optreden. Na de injectie komt de menstruatie vaak te vroeg, is deze heviger en langduriger dan gebruikelijk. Dit is onschuldig, maar kan hinderlijk zijn. Bij vrouwen na de overgang kan in de 1e weken na de injectie postmenopauzaal bloedverlies optreden.

- De bloedsuikerspiegel bij diabetes raakt soms ontregeld. Wij adviseren u om de eerste 1 á 2 weken na uw injectie regelmatig uw bloedsuiker te controleren.
- Lokale huidafwijkingen: dunner of stugger worden van de huid of verkleuringen van de huid. Dit komt zelden voor.
- Een allergische reactie; dit gebeurt zeer zelden.

Wanneer mag u geen injectie

- Als u zwanger bent;
- Als u allergieën heeft;
- Bij een verlaagde afweer;
- Als u een actieve infectie heeft.

Heeft u nog vragen

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust aan de doktersassistente of neem contact op met:

Polikliniek Orthopedie

T 010 297 54 20

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Injecties met Lidocaine en Kenacort
800815-NL / 2014-07