

Ferinject

Moeder en Kind Centrum



Beter voor elkaar

Inleiding

De gynaecoloog heeft met u besproken dat het ijzergehalte van uw bloed te laag is. Als een behandeling met een ander middel onvoldoende resultaat heeft, kunt u behandeld worden met het medicijn Ferinject®. Deze folder geeft algemene informatie over het belang van ijzer voor uw lichaam en de behandeling met Ferinject®.

IJzer in uw lichaam en ijzertekort

Uw lichaam heeft ijzer nodig. IJzer zorgt voor een goede conditie, bevordert de concentratie en het houdt uw huid, haar en nagels gezond. Ook versterkt het de afweer tegen ziektes.

De rode bloedlichaampjes in het bloed gebruiken ijzer om zuurstof op te nemen. Zij vervoeren het door het hele lichaam. Uw lichaam maakt zelf geen ijzer aan, daarom moet u dagelijks genoeg ijzer met het voedsel binnen krijgen.

Ongeveer 10% van het ijzer dat u via uw voeding binnenkrijgt, komt via de darm in het bloed terecht. Daar bindt het zich aan transferrine. Dit is een stof die ervoor zorgt dat het ijzer op die plaatsen in het lichaam komt waar het nodig is. Het ijzer dat het lichaam niet direct nodig heeft, wordt in de lever en de milt opgeslagen.

Onder bepaalde omstandigheden krijgt u onvoldoende ijzer binnen via het voedsel of neemt uw lichaam onvoldoende ijzer op. Het lichaam gebruikt dan het ijzer dat in de lever en milt is opgeslagen. Als die voorraad op is, ontstaat er ijzertekort.

De meest voorkomende oorzaak van ijzertekort bij gezonde mensen is bloedverlies.

IJzertekort kan op verschillende systemen in het lichaam van invloed zijn.

Dit kan leiden tot de volgende klachten:

- duizeligheid, hoofdpijn, depressieve stemming en concentratiestoornissen (de hersenen);
- hartritmestoornissen, benauwdheid en vermoeidheid (hart- en vaatstelsel);
- verminderde conditie, koude ledematen, benauwdheid (ijzergebrek in het bloed);
- verminderde eetlust (stofwisseling);
- scheurtjes in de mondhoeken en gebroken nagels (huid, haar en nagels);
- vatbaarheid voor infecties (immuunsysteem).

Vorbereitung

Voor de behandeling met Ferinject® hoeft u geen bepaalde voorbereidingen te treffen.

Neem uw patiëntenponsplaatje met de juiste gegevens mee.

Behandeling met Ferinject®

Uw arts heeft met u besproken dat u een eenmalige behandeling met Ferinject® krijgt. Dit medicijn wordt gebruikt voor het behandelen van ijzertekort, als andere tabletten of middelen met ijzerpreparaten niet snel genoeg werken of niet kunnen worden gebruikt. Het doel van de behandeling met Ferinject® is het behandelen van het ijzertekort door het aanvullen van de ijzervoorraad in het lichaam.

Omdat u het medicijn via een infuus krijgt toegediend, is er een afspraak met u gemaakt op de DayCare. Wanneer u op de afdeling komt, meldt u zich aan bij de intercom naast de schuifdeur. De verpleegkundige vraagt u om in de wachtruimte plaats te nemen, waar ze u ophaalt en naar de kamer begeleidt. Zij informeert naar uw allergieën en medicijngebruik en naar de naam van een contactpersoon, die zij kan bellen als dat nodig is. Hierna brengt een arts-assistent of een verpleegkundige een infuus met Ferinject® bij u in. De toedieningstijd van het medicijn is 15 tot 30 minuten. Dit betekent dat u een half uur aan het infuus bent aangesloten, waarna u nog minimaal 30 minuten ter observatie blijft. In totaal duurt de behandeling één á twee uur. U kunt iemand meenemen om tijdens de behandeling bij u te zijn.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u op eigen gelegenheid naar huis. U mag na de behandeling met Ferinject® autorijden. Na ongeveer acht dagen merkt u het resultaat van de behandeling. De klachten die u had door het ijzertekort zullen verminderen en / of verdwijnen. Na de behandeling met Ferinject® moet u de ijzertabletten die de arts u eerder heeft voorgeschreven, niet meer gebruiken. Ferinject® vervangt deze en vermeden moet worden dat u teveel ijzer binnen krijgt.

Soms is het noodzakelijk om de behandeling met Ferinject® na een week te herhalen.

Bijwerkingen

Ferinject® kan tijdens of na het toedienen bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen die vaak voorkomen zijn:

- hoofdpijn;
- duizeligheid;
- misselijkheid;
- buikpijn, verstopping of diarree;
- uitslag of reacties op de plaats waar het infuus in uw arm heeft gezeten.

De volgende klachten komen zelden voor:

- ernstige allergische reactie met benauwdheid;
- hartkloppingen;
- duizeligheid door lage bloeddruk;
- jeuk;
- rillerigheid.

(Pijn)klachten

Ervaart u tijdens de behandeling één van bovenstaande klachten, geef dit dan direct aan bij de verpleegkundige.

Ervaart u thuis klachten, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie, **T** (010) 297 64 20 of na kantoortijden met de DayCare, **T** (010) 297 59 76.

Ten slotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.



Ikazia Ziekenhuis

Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Ferinject
800881-NL / 2015-07