

# Nazorg na behandeling van aambeien (haemorrhoiden)



Beter voor elkaar



## Nawerkingen

Er is bij u een ingreep gedaan op de polikliniek met betrekking tot aambeien (haemorrhoiden). Na de behandeling kunt u de volgende klachten hebben:

- Pijn in het behandelde gebied en/of de onderbuik. Hiervoor kunt u eventueel paracetamol (500 mg) gebruiken, twee tabletten, zo nodig om de 4 uur.
- Het gevoel hebben naar het toilet te moeten.

## Na de behandeling

Verder is het volgende van belang:

- Na de behandeling is het belangrijk dat u het anaal gebied goed schoonhoudt, met name na de ontlasting.

In geval van behandeling met rubberbandjes:

- De rubberen bandjes verliest u vanzelf met de ontlasting. Hierbij kan wat gering bloedverlies plaatsvinden.
- Na de behandeling krijgt u een afspraak mee voor over ongeveer 6 weken. Dit is een vervolgbehandeling. Het is van belang dat u zich ook dan weer voorbereidt met het laxerende middel. Het recept hiervoor krijgt u mee van de assistente.

Bij hevige pijn na de behandeling of hevige nabloedingen raden wij u aan contact op te nemen met de Polikliniek Chirurgie, te bereiken via **T** 010 297 52 20. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.15 en 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u terecht op de Spoed Eisende Hulp, **T** 010 297 53 00.



## **Ikazia Ziekenhuis**

Montessoriweg 1  
3083 AN Rotterdam  
[www.ikazia.nl](http://www.ikazia.nl)

Nazorg na behandeling van aambeien ( haemorrhoiden )  
800884-NL / 2015-07