

Enteroscopie onder Propofol (proximaal)

Maag-Darm-Levercentrum



Beter voor elkaar

Binnenkort ondergaat u een enteroscopie onder Propofol. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd.

Aangezien u het onderzoek onder Propofol zult ondergaan is het van belang dat u allereerst de SPS (sedatie praktijk specialist) op de pre-operatieve polikliniek (POP) bezoekt. De SPS stelt u vragen over uw gezondheid en informeert u over de sedatie, die u krijgt voor het onderzoek.

Inleiding

Door middel van deze folder wil het Ikazia ziekenhuis u informeren over de enteroscopie die voor u is afgesproken. Hierin wordt omschreven wat een enteroscopie is en hoe de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg van het onderzoek verlopen. Wij adviseren u om deze informatie zorgvuldig te lezen.

Wat is een enteroscopie?

Dit is een onderzoek waarbij de arts via een dunne buigzame slang, de endoscoop, de binnenkant van de dunne darm bekijkt. Op deze manier kan men ontstekingen, poliepen, bloedingen of gezwellen opsporen. Bepaalde kleine ingrepen kunnen uitgevoerd worden door instrumenten via een kanaal in de scoop op te schuiven. Zo kan men kleine stukjes weefsel wegnemen (biopsie), bloedingen stelpen en poliepen verwijderen. Deze ingrepen zijn niet pijnlijk.

Informed consent

Als u ziek wordt, kunt u in een medische mallempolen terecht komen. Het lijkt misschien alsof u zelf niets te vertellen heeft over alle onderzoeken en behandelingen, die elkaar maar opvolgen. Echter, u mag zelf beslissen of u behandeld wordt en u mag ook kiezen welke behandeling u krijgt. Om deze beslissing te kunnen nemen, dient u wel goed geïnformeerd te zijn. Deze folder geeft u deze informatie. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten als patiënt, dan kunt u in dit ziekenhuis bij het Patiënten Service Bureau (begane grond) een brochure afhalen.

Vorbereiding voor het onderzoek

Het onderzoek kan alleen goed uitgevoerd worden als uw slokdarm en maag leeg zijn. **U mag daarom op de dag van het onderzoek vanaf 12 uur 's nachts niets meer eten.** Wel mag u **tot 4 uur voor het onderzoek** nog water, heldere appelsap of thee drinken.

U mag uw medicijnen met water innemen.

Procedure op de endoscopie-afdeling

Vorbereiding

Als u aankomt, meldt u zich bij de balie: routenummer 19. Hierna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

U wordt door een verpleegkundige uit de wachtruimte opgehaald en naar de voorbereidingsruimte gebracht. De begeleiding blijft achter in de wachtruimte.

Draag voor het onderzoek comfortabele loszittende kleding. In de voorbereidingsruimte krijgt u een venflon (infuusnaaldje). Ook neemt de verpleegkundige de vragenlijst nog door op veranderingen en noteren we uw contactpersoon. Als u een gebitsprothese in heeft vragen we u die uit te doen.

Het onderzoek

De Sedatie Praktijk Specialist haalt u op en rijdt u in het bed naar de onderzoekskamer. Hier krijgt u een zuurstofslangetje in uw neus waardoor extra zuurstof wordt toegediend. Ook krijgt u een knijper op de vinger, waarmee uw hartritme en uw zuurstofgehalte van uw bloed geregistreerd worden.

Vlak voor het onderzoek komt het endoscopieteam (endoscopist, endoscopie-assistenten en de SPS) samen, om aan de hand van een lijst een aantal gegevens te controleren. Dit heet een time-out procedure.

Hierna worden de pompjes met de sedatie gestart. De SPS blijft het hele onderzoek bij u en houdt alle metingen in de gaten en zorgt dat u voldoende sedatie krijgt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd terwijl u op de onderzoektafel op uw linkerzij ligt.

De endoscoop wordt door de ring in uw mond en keel gebracht. U wordt gevraagd om een slikbeweging te maken. Daarna moet u proberen om zo rustig en ontspannen mogelijk te ademen. Het instrument komt niet in uw luchtwegen en u kunt net zo ademen als anders. De endoscoop wordt via de slokdarm en de maag naar de twaalfvingerige darm opgevoerd. De endoscoop wordt met een speciale techniek, zover mogelijk de dunne darm ingeschoven.

Na het onderzoek

Na het onderzoek rijden wij u in het bed naar de uitslaapruimte van het MDL-centrum. Wanneer u goed wakker bent, krijgt u eten en drinken aangeboden. U mag na het onderzoek weer gewoon eten en drinken. Meestal mag u na 1 à 1½ uur de uitslaapruimte verlaten.

Omdat het onderzoek onder Propofol[®] wordt gedaan, moet u na afloop van het onderzoek door een familielid of kennis vanuit de wachtkamer naar huis gebracht worden.

Het is wettelijk niet toegestaan om op de dag van het onderzoek zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. U mag die dag niet zelf een auto, motorfiets of fiets besturen, u mag ook niet zonder begeleiding met openbaar vervoer of taxi reizen.

De uitslag

De uitslag krijgt u op uw bezoek aan de polikliniek of, als de huisarts het onderzoek heeft aangevraagd, via uw huisarts.

Eventuele bij- of nawerkingen

Na het onderzoek is het mogelijk dat u pijnklachten ervaart, meestal als gevolg van darmkrampen door de ingeblazen lucht. Deze klachten nemen snel af, als u de lucht laat ontsnappen, dus winden laat of lucht opboert. Over het algemeen is een enteroscopie een veilig onderzoek en complicaties komen gelukkig zelden voor, maar wij willen u hierover wel informeren.

Door het verwijderen van poliepen kan een bloeding optreden. Een dergelijke bloeding kan direct tijdens de behandeling optreden, maar ook tot 14 dagen daarna. Dit stopt meestal spontaan. Een ziekenhuisopname kan noodzakelijk zijn en soms moet een nieuwe enteroscopie worden gedaan om de bloeding te behandelen. In zeer zeldzame gevallen is een buikoperatie nodig.

Door het onderzoek kan een beschadiging (perforatie) van de darmwand ontstaan. De kans hierop is groter als de darm ernstig ontstoken is, als er veel uitstulpingen (divertikels) zijn, als er sprake is van een vernauwing of na het verwijderen van een poliep. Er treedt dan ernstige buikpijn op, met later ook koorts. Er is dan vrijwel altijd een ziekenhuisopname nodig en een buikoperatie kan noodzakelijk zijn.

Overige belangrijke zaken

Antistollingsmedicijnen

Gebruikt u antistollingsmedicijnen dan komt u op het pre-scopie spreekuur en wordt dit met u besproken. Of uw MDL-arts heeft u hierover ingelicht op uw poli-afspraak.

Heeft u dit nog niet met ons besproken neem dan contact met ons op.

IJzertabletten

Als u ijzertabletten gebruikt, moet u deze een week voor het onderzoek stoppen.

Diabetes mellitus / suikerziekte

Als u diabetes mellitus (suikerziekte) heeft en hiervoor medicijnen gebruikt (tabletten of insuline), kunt u de folder "**Insulinemedicatie aanpassen tijdens nuchter beleid voor gastroscopie**" opvragen met richtlijnen hierover. Deze folder kunt u verkrijgen via de diabetesverpleegkundige, MDL-centrum of via de secretaresse van uw behandelend arts. Het is belangrijk dat u uw insulinepen, insuline en glucosemeter meeneemt.

Pacemaker of ICD

Heeft u een ICD kastje of een pacemaker? Meld dit dan vooraf (telefonisch).

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Meld dit van tevoren. Meestal kunt u dit onderzoek dan niet laten verrichten.

Overig

Een week voor het onderzoek mogen geen maag- of darmfoto's gemaakt worden, waarbij bariumpap wordt gebruikt.

Telefoonnummers

De volgende telefoonnummers zijn voor u van belang als u de arts of het MDL-centrum wilt bereiken:

Maandag tot en met vrijdag van 8.15 – 16.15 uur:

T 010 – 297 53 74

U krijgt het MDL-centrum aan de telefoon.

Op andere dagen en tijdstippen:

T 010 – 297 50 00

U krijgt de receptioniste aan de telefoon. Vraag naar de dienstdoende arts-assistent Inwendige Geneeskunde.

Mocht u thuis nog vragen hebben over het onderzoek dan kunt u onze website bekijken www.ikazia.nl of bellen naar het MDL-centrum Ikazia,

T 010 – 297 53 74.



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.