

# Pregabaline

Anesthesie/ Pijnbestrijding



Beter voor elkaar

## Doel van de behandeling

Er is met u afgesproken dat u gaat starten met het medicijn pregabaline, ook wel bekend als Lyrica(R). Dit medicijn is effectief bij de behandeling van zenuwpijn. Van oorsprong wordt dit middel gebruikt voor de behandeling van epilepsie. Bij deze toepassing bleek dat dit medicijn ook effectief is voor de behandeling van zenuwpijn. Met deze reden is dit medicijn aan u voorgeschreven.

Pregabaline moet worden opgebouwd volgens een schema. Als er ongewenste bijwerkingen optreden, kan de dosering worden teruggebracht naar een lagere dosering en eventueel later weer opgebouwd worden.

## Opbouwschema

Dag	Ochtend	Avond	Dosering per dag
1	–	1x 75 mg	75 mg
2	–	1x 75 mg	75 mg
3	–	1x 75 mg	75 mg
4	1x 75 mg	1x 75 mg	150 mg
5	1x 75 mg	1x 75 mg	150 mg
6	1x 75 mg	1x 75 mg	150 mg
7	1x 75 mg	2x 75 mg	225 mg
8	1x 75 mg	2x 75 mg	225 mg
9	1x 75 mg	2x 75 mg	225 mg
10	2x75 mg	2x75 mg	300 mg

## **Mogelijke complicaties en bijwerkingen**

Het is goed te weten dat ieder geneesmiddel bijwerkingen heeft, maar niet iedereen daar iets van merkt. De meest voorkomende bijwerkingen die zijn gemeld bij het gebruik van Pregabaline zijn duizeligheid en slaperigheid. Daarnaast beïnvloed pregabaline de rijvaardigheid.

Bij het voorschrijven van pregabaline heeft u een telefonische afspraak gekregen, meestal twee weken nadat u bent gestart met het gebruik van het medicijn. Tijdens deze telefonische afspraak worden met u de werking en de eventuele bijwerkingen van het medicijn besproken. In het gesprek wordt ook besproken of de dosering van de pregabaline verder opgehoogd wordt.

## **Vragen**

Heeft u, na het lezen van deze folder, nog vragen over het medicijn of heeft u last van bijwerkingen neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding.

**T** 010-2975430



**Ikazia Ziekenhuis**  
Montessoriweg 1  
3083 AN Rotterdam  
[www.ikazia.nl](http://www.ikazia.nl)

Pregabaline  
801097-NL / 2017-06