

Gabapentine

Anesthesiologie/Pijnbestrijding



Beter voor elkaar

Doel van de behandeling

Er is met u afgesproken dat u gaat starten met het medicijn gabapentine, ook wel bekend als Neurontin®. Dit medicijn helpt bij de behandeling van zenuwpijn.

Van oorsprong wordt dit middel gebruikt voor de behandeling van epilepsie. Terwijl het hiervoor gebruikt werd, bleek dat dit medicijn ook helpt bij de behandeling van zenuwpijn. Met deze reden is dit medicijn aan u voorgeschreven.

Opbouwschema

Het gebruik van gabapentine moet worden opgebouwd volgens één van onderstaande schema's. Als er ongewenste bijwerkingen optreden, kan de dosering worden verlaagd en eventueel later weer opgebouwd worden.

Als u moet of wilt stoppen met het gebruik van gabapentine, bespreek dan met uw behandelend arts of de pijnverpleegkundige hoe u de dosering van het medicijn het beste kunt afbouwen.

| <i>Dag</i> | <i>Ochtend</i> | <i>Middag</i> | <i>Avond</i> | <i>Dosering per dag</i> |
|------------|----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | | | 1 x 100 mg | 100 mg |
| 2 | 1 x 100 mg | | 1 x 100 mg | 200 mg |
| 3 | 1 x 100 mg | 1 x 100 mg | 1 x 100 mg | 300 mg |
| 4 | 1 x 100 mg | 1 x 100 mg | 2 x 100 mg | 400 mg |
| 5 | 2 x 100 mg | 1 x 100 mg | 2 x 100 mg | 500 mg |
| 6 | 2 x 100 mg | 2 x 100 mg | 2 x 100 mg | 600 mg |
| 7 | 2 x 100 mg | 2 x 100 mg | 1 x 300 mg | 700 mg |
| 8 | 1 x 300 mg | 2 x 100 mg | 1 x 300 mg | 800 mg |
| 9 | 1 x 300 mg | 1 x 300 mg | 1 x 300 mg | 900 mg |
| 10 | 1 x 300 mg | 1 x 300 mg | 1 x 300 mg + 1 x 100 mg | 1000 mg |

De tabel gaat verder op de volgende pagina.

| <i>Dag</i> | <i>Ochtend</i> | <i>Middag</i> | <i>Avond</i> | <i>Dosering per dag</i> |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 11 | 1 x 300 mg + 1 x 100 mg | 1 x 300 mg | 1 x 300 mg + 1 x 100 mg | 1100 mg |
| 12 | 1 x 300 mg + 1 x 100 mg | 1 x 300 mg + 1 x 100 mg | 1 x 300 mg + 1 x 100 mg | 1200 mg |
| 13 | 1 x 300 mg + 1 x 100 mg | 1 x 300 mg + 1 x 100 mg | 1 x 300 mg + 2 x 100 mg | 1300 mg |
| 14 | 1 x 300 mg + 2 x 100 mg | 1 x 300 mg + 1 x 100 mg | 1 x 300 mg + 2 x 100 mg | 1400 mg |
| 15 | 1 x 300 mg + 2 x 100 mg | 1 x 300 mg + 2 x 100 mg | 1 x 300 mg + 2 x 100 mg | 1500 mg |
| 16 | 1 x 300 mg + 2 x 100 mg | 1 x 300 mg + 2 x 100 mg | 2 x 300 mg | 1600 mg |
| 17 | 2 x 300 mg | 1 x 300 mg + 2 x 100 mg | 2 x 300 mg | 1700 mg |
| 18 > | 2 x 300 mg | 2 x 300 mg | 2 x 300 mg | 1800 mg |

Na dag 18 blijft de dosering hetzelfde.

Alternatief opbouwschema

Er is een alternatief opbouwschema waarbij alleen capsules van 300 milligram gebruikt hoeven te worden.

| <i>Dag</i> | <i>Ochtend</i> | <i>Middag</i> | <i>Avond</i> | <i>Dosering per dag</i> |
|--------------|----------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 1 t/m 3 | | | 1 x 300 mg | 300 mg |
| 4 t/m 6 | 1 x 300 mg | | 1 x 300 mg | 600 mg |
| 7 t/m 9 | 1 x 300 mg | 1 x 300 mg | 1 x 300 mg | 900 mg |
| 10 t/m 12 | 1 x 300 mg | 1 x 300 mg | 2 x 300 mg | 1200 mg |
| 13 t/m 15 | 2 x 300 mg | 1 x 300 mg | 2 x 300 mg | 1500 mg |
| 16 en verder | 2 x 300 mg | 2 x 300 mg | 2 x 300 mg | 1800 mg |

Na dag 16 blijft de dosering hetzelfde.

Dosering

Bij mensen die normaal werkende nieren en een normaal werkende lever hebben, is de maximale dosering 3600 mg per dag (3 keer per dag 1200 mg).

U wordt geadviseerd om het gebruik van gabapentine op te bouwen tot een dosering per dag van 1800 milligram (3 maal per dag 600 milligram, dag 18). U kunt hierbij het effect beoordelen. Als u bij een lagere dosering al een goed effect bemerkt, hoeft u de dosering niet verder te verhogen en kunt u de lagere dosering blijven gebruiken.

Mogelijke complicaties/ bijwerkingen

Het is goed om te weten dat ieder geneesmiddel bijwerkingen heeft, maar dat niet elke gebruiker deze bijwerkingen zal krijgen. De bijwerkingen die het meest voorkomen bij het gebruik van gabapentine zijn duizeligheid en slaperigheid. Daarnaast beïnvloedt gabapentine de rijvaardigheid.

Afspraak

Bij het voorschrijven van gabapentine heeft u een telefonische afspraak gekregen. Deze afspraak is meestal twee weken nadat u bent gestart met het gebruik van het medicijn. Tijdens deze telefonische afspraak zullen we de werking en de eventuele bijwerkingen van het medicijn met u bespreken. In het gesprek zal besproken worden of de dosering van gabapentine verder verhoogd wordt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het medicijn? Of heeft u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met de pijnpoli.

U kunt de pijnpoli telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 – 16.30 uur.

T 010 2975430



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.