

# Amitriptyline / Nortriptyline

Anesthesie/ Pijnbestrijding



Beter voor elkaar

## Doel van de behandeling

Er is met u afgesproken dat u gaat starten met het medicijn Amitriptyline/Nortriptyline, ook wel bekend als Triptizol, Sarotex en Nortrilen. Van oorsprong wordt dit middel gebruikt bij de behandeling van depressiviteit. Bij deze toepassing bleek dat dit medicijn ook effectief is voor de behandeling van zenuwpijn. Met deze reden is dit medicijn aan u voorgeschreven.

Daarnaast heeft het medicijn een ontspannend effect waardoor het, bij inname voor de nacht, de nachtrust kan bevorderen.

Amitriptyline/Nortriptyline moet worden opgebouwd volgens een schema. Indien er ongewenste bijwerkingen optreden, kan de dosering worden teruggebracht en eventueel later weer opgebouwd worden.

## Opbouwschema

Week	Dosering per dag
1	10 mg
2	20 mg
3	30 mg
4	40 mg
5	50 mg

## **Resultaat**

Amitriptyline/Nortriptyline werkt niet direct, maar is effectief na één tot twee weken.

## **Mogelijke complicaties/ bijwerkingen**

Het is goed te weten dat ieder geneesmiddel bijwerkingen heeft, maar dat niet iedere persoon hier last van heeft. Eén van de bijwerkingen van Amitriptyline/Nortriptyline is sufheid. Amitriptyline wordt voor de nacht ingenomen, zodat u gedurende de dag minder last heeft van deze bijwerking. Daarnaast zijn de meest voorkomende bijwerkingen die zijn gemeld bij gebruik van Amitriptyline/Nortriptyline duizeligheid, misselijkheid en obstipatie.

Ook beïnvloed Amitriptyline/Nortriptyline de rijvaardigheid.

De bijwerkingen worden minder naarmate u het medicijn langer gebruikt.

## **Afspraak**

Bij het voorschrijven van Amitriptyline/Nortriptyline heeft u een telefonische afspraak gekregen, meestal twee weken nadat u bent gestart met het medicijn. Tijdens deze telefonische afspraak worden met u de werking en de eventuele bijwerkingen van het medicijn besproken.

In het gesprek wordt ook besproken of de dosering van Amitriptyline/Nortriptyline verder opgehoogd wordt.

## **Vragen**

Heeft u, na het lezen van deze folder nog vragen over het medicijn of heeft u last van bijwerkingen, neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding.

**T** 010-2975430



**Let op:** In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

**Please note:** This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

**Dikkat:** Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

**Uwaga:** Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

**انتبه:** هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.