

Infectie van een gewrichtsprothese

Orthopedie



Beter voor elkaar

Inleiding

U bent opgenomen op de verpleegafdeling Orthopedie omdat u mogelijk een infectie heeft van uw gewrichtsprothese. In deze folder vindt u informatie over uw opname en de behandeling van de infectie. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan de behandelend arts of verpleegkundige.

U bent opgenomen op afdeling 5A Orthopedie. Deze afdeling is bereikbaar op telefoonnummer:

T 010-2975251

U heeft een opnamegesprek met de verpleegkundige van de afdeling. Zij noteert gegevens die van belang zijn voor uw behandeling in het ziekenhuis.

Als u een infectie heeft, ligt u vrij lang in het ziekenhuis. Gemiddeld duurt het 6 weken voor u weer naar huis mag.

Wat neemt uw familie voor u mee naar het ziekenhuis?

- Nachtkleding;
- Toiletartikelen;
- Gemakkelijke ruimzittende kleding;
- Boeken, tijdschriften, tablet om u te vermaken.

Wat is een infectie?

Een infectie is een ontsteking van een (operatie)wond. Deze ontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën. Van een infectie kunt u erg ziek worden en hoge koorts krijgen. Daarom is het belangrijk om de infectie snel te behandelen. Als u een infectie bij een prothese heeft, kan de prothese gaan loslaten.

Er zijn twee soorten infecties, een vroege infectie en een late infectie:

- **Vroege infectie**

Een vroege infectie ontstaat snel na de operatie. Een vroege infectie kan je herkennen aan: plaatselijke roodheid, zwelling, pijn en soms ook koorts. Ook kan de operatiewond (opnieuw) wondvocht of pus lekken.

- **Late infectie**

Een late infectie merk je soms pas maanden of jaren na de operatie. Een late infectie kan je voornamelijk herkennen aan pijn op de plek van de prothese en rond de prothese. Deze pijn is er vooral bij het in beweging komen en lopen.

Oorzaak

Toen de prothese bij u werd ingebracht, zijn er maatregelen genomen om de kans op besmetting met bacteriën kleiner te maken. Dit is gedaan door onder andere het operatiegebied te desinfecteren en door steriel (schoon) te werken. Ook heeft u antibiotica gekregen voor de operatie. Toch kan het soms gebeuren dat er een infectie optreedt. Deze infectie kan ontstaan op een andere plek in het lichaam. Via de bloedbaan kan deze infectie dan naar de prothese gebracht worden, waardoor het gewricht ontstoken raakt. Dit noemen we ook wel bloedvergiftiging. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een urineweginfectie, een ontstoken kies of een longontsteking.

Onderzoek

Aan de hand van uw klachten (zoals pijn en roodheid van de wond en koorts) kunnen we vaststellen dat u een infectie heeft. Daarnaast nemen we ook bloed af en wordt er eventueel een punctie verricht of een wondkweek gedaan. Deze worden in het laboratorium onderzocht.

Behandeling

De behandeling van de infectie bestaat uit het toedienen van antibiotica. Ook wordt de wond operatief gespoeld en wordt er antibiotica (gentamycinekralen of -sponsjes) in de wond aangebracht. Als de infectie heel ernstig is, moet de prothese worden verwijderd.

Antibiotica

De antibiotica worden via een infuus of in tabletvorm aan u toegediend. Of u een infuus of tabletten krijgt, hangt af van het soort antibioticum dat u krijgt. Uit het laboratoriumonderzoek blijkt welke ziekteverwekker u heeft. Daar wordt de antibiotica op uitgekozen, zodat deze goed op de ziekteverwekker in kan werken.

Sommige patiënten krijgen bijwerkingen van de antibiotica; bijvoorbeeld een verminderde eetlust, smaakverandering, misselijkheid, diarree.

Verwijderen prothese

Als de prothese verwijderd moet worden, krijgt u soms een tijdelijke prothese. De tijdelijke prothese bevat vaak antibiotica die geleidelijk en gedurende langere tijd in het infectiegebied worden afgegeven. U kunt deze prothese **niet** belasten.

In een knie kan meestal een tijdelijke prothese worden geplaatst, in een heup gebeurt dit minder vaak. Als de heupkop wordt verwijderd maar niet wordt vervangen door een (tijdelijke) prothese, heet dit ook wel een 'girdlestone'. Dit is meestal een tijdelijke situatie waarin uw been iets korter is. U kunt dan wel lopen, maar met behulp van krukken.

Controle

Elke week wordt er bloed geprikt om te zien of de infectiewaarden in het bloed dalen. Dit is een teken dat de behandeling aanslaat. Ook wordt dagelijks uw temperatuur gemeten.

Ontslag

Wanneer u 6 weken antibiotica heeft gehad, volgt een rustperiode. Het direct terugplaatsen van de prothese is een te groot risico, omdat er kans is op direct een nieuwe infectie.

Als uw thuissituatie het toelaat, brengt u deze rustperiode thuis door. Als dit thuis niet mogelijk is, verblijft u tijdelijk op een revalidatie-afdeling.

Vervolg

Na 3 maanden komt u terug op de polikliniek voor controle. Dan wordt er bloed geprikt om te zien of uw infectiewaarden normaal zijn. De orthopeed bespreekt met u wanneer de operatie wordt gepland voor het opnieuw plaatsen van een prothese.



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.