

MyoSure behandeling

Gynaecologie



Beter voor elkaar

Inleiding

Veel vrouwen hebben last van vleesbomen en/of poliepen in de baarmoeder. Dit geeft vaak pijnlijke en vervelende klachten. Als deze verwijderd moeten worden, kan dit met behulp van de MyoSure behandeling.

Vleesbomen

Een vleesboom is een goedaardig gezwel in de spierwand van de baarmoeder. Het is nog niet duidelijk waardoor vleesbomen worden veroorzaakt. Het is wel bekend dat vleesbomen worden beïnvloed door hormonen. Daarom bestaan ze vaak tijdens de leeftijden waarin vrouwen menstrueren.

De meeste vrouwen hebben geen last van klachten en weten vaak niet dat ze een vleesboom hebben. Als er wel klachten aanwezig zijn, zijn veel voorkomende symptomen: hevig bloedverlies tijdens de menstruatie, langdurige menstruaties, bloedingen tussen de menstruaties en druk of pijn in de buik.

Poliepen

Een poliep is een (bijna altijd) goedaardige uitstulping van het baarmoederslijmvlies. Poliepen kunnen ook in het baarmoederhalskanaal groeien. Vaak zijn er meerdere poliepen aanwezig. Het is nog niet duidelijk waardoor poliepen worden veroorzaakt. Het is wel bekend dat poliepen worden beïnvloed door hormonen. Als er meer hormonen aanwezig zijn in het lichaam, groeit het baarmoederslijmvlies. Hierdoor groeien ook de poliepen die op het baarmoederslijmvlies zitten.

Poliepen in de baarmoeder komen vooral voor bij vrouwen tussen de 40 en de 50 jaar, vrouwen in de overgang, vrouwen die poliepen in de baarmoederhals hebben en vrouwen die overgewicht hebben.

De meeste vrouwen hebben geen last van klachten en weten vaak niet dat ze poliepen in de baarmoeder hebben. Als er wel klachten aanwezig zijn, zijn veel voorkomende symptomen: hevig bloedverlies tijdens de menstruatie, onregelmatige menstruaties, tussentijdse bloedingen en vaginaal bloedverlies na de menopauze.

MyoSure behandeling

Vleesbomen en poliepen konden vroeger alleen worden verwijderd onder algehele narcose op de operatiekamer. Hiervoor moest de patiënt worden opgenomen in het ziekenhuis en na de behandeling nog herstellen van de narcose. Met de MyoSure behandeling hoeft dit niet meer. De gynaecoloog kan dan relatief snel een vleesboom of poliep uit de baarmoeder verwijderen via de vagina. Het verwijderen van een vleesboom van 3 cm duurt ongeveer 10 minuten. De hersteltijd na de behandeling is kort omdat u niet onder narcose wordt gebracht. Ook blijft de baarmoeder intact, wat belangrijk is wanneer u kinderen wilt krijgen.

U komt in aanmerking voor de behandeling als u:

- niet zwanger bent;
- geen last hebt van bekkeninfecties;
- geen last hebt van afwijkingen aan de baarmoederhals;
- geen baarmoeder(hals)kanker heeft.

Vóór de behandeling

Plaatselijke verdoving is niet altijd nodig bij deze behandeling. Het verwijderen van de vleesboom of poliep doet namelijk geen pijn. Het kan wel gevoelig zijn wanneer de hysteroscoop (een kijkbuis) de baarmoedermond passeert. De baarmoeder kan ook gaan krampen. Daarom wordt er soms gekozen voor een lichte, plaatselijke verdoving. Deze kan in de baarmoedermond gezet worden.

Tijdens de behandeling

Bij het starten van de behandeling wordt er vocht in de baarmoeder gebracht. Door het vocht worden de baarmoederwanden uit elkaar geduwd. Hierdoor kan er beter in de baarmoeder gekeken worden. De gynaecoloog brengt de hysteroscoop in waarmee gekeken wordt waar de vleesboom of poliep zich precies bevindt. Als deze gevonden is, wordt de MyoSure door de hysteroscoop heen geschoven en precies bij de vleesboom of poliep geplaatst. De MyoSure verwijdert de vleesboom of poliep en zuigt het weefsel op. Hierdoor blijft er niets achter in de baarmoeder. Het weefsel wordt na de behandeling onderzocht op de aanwezigheid van kwaadaardige cellen. De kans op kwaadaardige cellen is erg klein.

Risico's

Elke behandeling brengt risico's met zich mee. De MyoSure behandeling kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot perforatie van de baarmoederwand en infecties.

Na de behandeling

U mag vaak nog dezelfde dag weer naar huis. De kans is groot dat u een dag na de behandeling weer kan beginnen met uw dagelijkse bezigheden. Het is mogelijk dat u direct na de behandeling last krijgt van kramp, lichte pijn, misselijkheid en/of braken.

Heeft u nog vragen, stelt u deze dan aan de arts of de verpleegkundige. U kunt ook bellen met de polikliniek Gynaecologie.

T 010 297 52 40

Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur.



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.