

Picoprep voorbereiding colono- en gastroscopie

Maag-Darm-Levercentrum



Beter voor elkaar

Colono- en gastroscopie met Picoprep als voorbereiding

Voor een dergelijk onderzoek is het noodzakelijk dat uw maag leeg is (nuchter) en de darmen goed schoon zijn. Resten darminhoud kunnen een goed zicht op de darmwand onmogelijk maken.

De arts heeft het middel Picoprep als voorbereiding voorgeschreven. U kunt dit recept afhalen bij uw apotheek. Afhankelijk van het tijdstip van het onderzoek moet u de Picoprep volgens bijgevoegd schema gebruiken.

Instructie vóór het voorbereiden van het onderzoek

Vanaf 3 dagen vóór het onderzoek stoppen volgt u een vezelarm dieet. Dat wil zeggen **geen** kiwi's, sinaasappels, druiven en/of brood met pitjes en peulvruchten eten. Zie onderstaande voedingslijst

	Wel eten Vezelarm	Niet eten Vezelrijk
Graanproducten	wit brood, licht bruin brood, beschuit, toast, witte rijst, pasta (bv spaghetti, macaroni) pannenkoeken, crackers (zonder zaden en pitten).	bruin-, volkoren- en roggebrood, tarwe- en maïszemelen, muesli, cruesli, volkoren- en meergranenpasta's, havermout(pap), zilvervliesrijst.
Groente	aardappelen, gaar gekookte groenten, zoals wortelen, bloemkool, broccoli, sperziebonen uit blik/pot, pastinaak, knolselderij, zoete aardappel, pompoen.	asperges, bleekselderij, zuurkool, snijbonen, sperziebonen, prei, doperwtten, peulvruchten, taugé, maïs, champignons, tomaten, rauwkorst en ui.

	Wel eten Vezelarm	Niet eten Vezelrijk
Fruit	rijp fruit zonder schil en zaden zoals: appel, peer en banaan (beperk dit wel tot maximaal 2 stuks per dag) appelmoes, vruchtenmoes.	onrijp fruit, sinaasappel, grapefruit, mandarijn, ananas, mango, kiwi, druiven, gedroogde (zuid)vruchten zoals: dadels, vijgen, pruimen, krenten, rozijnen. Kokos en vruchtensappen met vruchtvlees.
Noten, pinda's en zaden		alle nootsoorten, pinda's, sesamzaad, maanzaad, zonnebloempitten.
Tussendoortjes	cake, chocolade (zonder nootjes) snoep, ijs, yoghurt, vla, pudding.	popcorn, (meergranen) koekjes, vruchtenyoghurt.
Broodbeleg	boter, margarine, halvarine, kaas (behalve komijn), smeerkaas, kipfilet, ham, rookvlees, salami, ei, boterhamworst, leverworst, paté, hagelslag, pasta, fruithagel.	pindakaas, komijnenkaas, jam met pitjes, kokosbrood, muisjes.
Vis en vlees	alle soorten vlees, vis en kip.	

Volg dit schema:

De dag voorafgaand aan het onderzoek

- Ontbijt (**8.00 – 9.00 uur**):

Bijvoorbeeld:

2 koppen thee of andere heldere dranken

1 gekookt ei

2 sneetjes witbrood met 1 plakje kaas/smeerkaas en jam zonder pitjes of schilletjes.

Of

2 koppen thee of andere heldere dranken

Schaaltje vla, (soja)yoghurt of pudding.

- Tussendoor (**9.00 – 12.00 uur**):

Bijvoorbeeld:

2 koppen thee of andere heldere dranken

1 glas appelsap of sportdrink.

- Lunch (**12.00 – 14.00 uur**):

Bijvoorbeeld:

2 koppen bouillon

1 portie kip zonder vel of 1 portie vis zonder graat of jam zonder pitjes of schilletjes

2 witte boterhammen

1 glas appelsap of sportdrink.

Of

Schaaltje vla, (soja)yoghurt of pudding

2 koppen bouillon

1 glas appelsap of sportdrink.

Nadat u uw lunch op heeft mag u niets meer eten, u mag nog wel heldere dranken drinken. Bijvoorbeeld water (met of zonder smaak), sportdrink, heldere appelsap, heldere gezeefde bouillon, heldere kruiden- of vruchtenthee. Dus niet teogestaan: koffie, zwarte thee, rode (vruchten) sap, troebele vruchtensap en melkproducten.

- Om **16.00 uur** neemt u 2 tabletten Bisacodyl is
- Om **18.00 uur** opent u de verpakking van Picoprep en haalt u er één zakje uit.
- Doe de inhoud van het eerste sachet in een glas met 150 ml koud water. Roer 2 à 3 minuten.
- Wanneer de melkachtige oplossing warm wordt, wacht u tot deze is afgekoeld. Daarna drinkt u deze op.
- Tussen ca **18.30 uur –21.30 uur** drinkt u minimaal **2 liter** aan heldere vloeistoffen.

De dag van het onderzoek

- Op de dag van het onderzoek mag u niets meer eten.
- Om **07.00** uur maakt u (op dezelfde wijze als de vorige dag) het tweede glas Picoprep® klaar, en drinkt dit op.
- Meteen daarna drinkt u, tot **09.00** uur, weer 2 liter heldere vloeistoffen.

Om braken tijdens en/of na de sedatie te voorkomen, met als gevolg dat de maaginhoud in de longen terecht kan komen, moet u voor de colono-gastroscoopie 'nuchter' zijn, wat betekent dat uw maag leeg moet zijn. Dit houdt in dat u tot **4 uur** voor het onderzoek **heldere vloeistoffen** mag drinken.

Advies: probeer tijdens het voorbereiden zoveel mogelijk te blijven bewegen, dit zorgt ervoor dat de darmen beter en sneller schoon zijn.

Als u last heeft van hoofdpijn tijdens het voorbereiden mag u eventueel paracetamol 500mg innemen.

Contact

Maag-darm-levercentrum.

T 010 297 53 74

www.ikazia.nl



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.