

Wachttijden en operaties

Chirurgie



Beter voor elkaar

Voorlichting wachttijd operatieve interventies

Uw arts heeft met u een operatieve ingreep afgesproken. De operatie moet nu ingepland worden. Dit verloopt via het opnamebureau. Dit bevindt zich op de eerste etage bij de hoofdingang.

Voordat de operatie daadwerkelijk plaats kan vinden wordt u nog beoordeeld door de anesthesist. Dit is de arts die de narcose tijdens de operatie zal verzorgen. U krijgt hiervoor een afspraak op de pre operatieve poli (POP) van de anesthesie. De anesthesist bekijkt samen met u of u een algehele narcose of andere vorm van anesthesie kunt ondergaan. Soms is hiervoor nog advies of beoordeling van een andere specialist nodig.

Als de anesthesist toestemming gegeven heeft voor de operatie kan deze worden ingepland.

Bij het opnamebureau hebt u kunnen aangeven in welke periode u bij voorkeur geopereerd zou willen worden. Helaas is het niet altijd mogelijk om hieraan tegemoet te komen. Voor sommige operaties bestaat een wachtlijst.

Op korte termijn zo'n operatie inplannen is dan vaak niet mogelijk.

Uw behandelend arts heeft slechts zeer beperkt invloed op de wachtlijst. Hoewel u tijdens de wachttijd op de operatie nog steeds klachten van uw aandoening kunt hebben vormt de wachttijd geen risico voor uw gezondheid.

Voor sommige aandoeningen bestaat er een kleine kans op verandering van de klachten waarvoor beoordeling door uw arts nodig kan zijn.

Als u galstenen heeft kunt u tijdens de wachttijd nog steeds pijn aanvallen in de buik houden. Hiervoor hoeft u geen contact op te nemen met uw behandelend arts.

Als de buikpijn samen gaat met koorts (gemeten temperatuur > 38 graden) of met gelige verkleuring van oogwit of huid, donkere (cola kleurig) verkleuring van de urine in combinatie met bleke kleur van de ontlasting (stopverf kleur) is dat reden om wel contact op te nemen met het ziekenhuis.

Als u een liesbreuk, littekenbreuk of navelbreuk heeft kan de zwelling tijdens de wachttijd groter worden. Ook hiervoor is het niet nodig contact op te nemen met uw behandelend arts.

Als de zwelling pijnlijk is en niet meer verdwijnt bij plat liggen of niet meer terug te duwen is terwijl dit voorheen wel het geval was raden wij u aan contact op te nemen met het ziekenhuis. Als u hierbij buikpijn krijgt met misselijkheid of zelfs braken moet u contact opnemen met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Voor vragen over de duur van de wachttijd kunt u contact opnemen met het opnamebureau,

T 010 297 57 57

Voor vragen over verergering van uw klachten waarvoor het advies geldt contact op te nemen met het ziekenhuis kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie of de spoedeisende hulp,

Polikliniek chirurgie

T 010 297 52 20

Spoedeisende hulp

T 010 297 53 00



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.