

Lachgas bij kinderen

Moeder en Kind Centrum



Beter voor elkaar

Binnenkort komt u met uw kind voor een behandeling met lachgas in het ziekenhuis. Lachgas is een reuk- en smaakloos gas en wordt toegediend in een mengsel met zuurstof. Het doel hiervan is om uw kind kortdurend in een staat van wakkere ontspanning te brengen (milde sedatie), waardoor een medische ingreep gemakkelijker kan plaatsvinden. Lachgas heeft namelijk een kalmerende werking, waardoor uw kind minder angst en stress zal ervaren.

Vorbereiding

U kunt uw kind het beste helpen door thuis al te beginnen met een goede uitleg aan uw kind.

Dit zorgt ervoor dat de behandeling minder spannend is, omdat uw kind weet wat hem/haar te wachten staat.

Deze behandeling wordt over het algemeen ingepland, wanneer uw kind al wat angstig is. Dus het is prettig wanneer uw kind er van tevoren vertrouwen in heeft. Op YouTube zijn er verschillende filmpjes te vinden over deze behandeling. Maar u kunt ook oefenen met ademen in een papieren bekertje thuis (zogenaamd het kapje) waar u de onderkant uitknijpt.

Nuchter

Uw kind hoeft niet nuchter te zijn. We raden aan om licht te ontbijten/ lunchen. Vermijd vette voedingsmiddelen.

Behandeling

Deze behandeling vindt plaats op de Kinderafdeling 2D, route 70. U wordt door een kinderverpleegkundige/kinderarts geholpen die speciaal geschoold is in het geven van lachgas. Op doordeweekse dagen zal er ook een medisch pedagogisch zorgverlener aanwezig zijn die u en uw kind helpt tijdens de behandeling.

Van tevoren worden er nog wat zaken met u doorgenomen;

- De gezondheid van uw kind;
- (Eventueel) medicijngebruik;
- Uitleg over de behandeling;
- Passen van het kapje;
- De te verwachten effecten van het lachgas.

Het is belangrijk dat uw kind rustig is tijdens het uitvoeren van de behandeling en de ruimte een beetje donker is. Tijdens de behandeling krijgt uw kind een kapje op zijn/haar neus en mond en een zachte knijper om de vinger die het zuurstofgehalte meet (saturatiemeter). Er is maar één iemand aan het woord, zodat u kind zich beter kan ontspannen tijdens de behandeling.

Tijdens de behandeling ligt uw kind op de behandelafel, of liggend bij vader/moeder. Na ongeveer 3 tot 5 minuten ademen in het kapje, zal uw kind effect merken van de lachgas. Uw kind kan een wat dromerig/zwevend gevoel ervaren.

Als de medische handeling is verricht, wordt het kapje worden opgetild, om nog aanwezige lachgas in de uitgeademde lucht weg te zuigen.

Tegelijkertijd kan het voorkomen dat er via een neusbril nog extra zuurstof wordt aangeboden. Na de behandeling hebben de meeste kinderen weinig tot geen herinnering aan wat er is gebeurd.

Uw kind blijft nog gedurende 30 minuten aanwezig in de behandelruimte en kan daarna naar huis.

Bijwerkingen

De meeste kinderen ervaren geen bijwerkingen van deze behandeling. Bijwerkingen die kunnen ontstaan zijn duizeligheid, licht in het hoofd, euforie, misselijkheid en braken.

Wanneer u zwanger bent wordt het afgeraden om bij de behandeling aanwezig te zijn.



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.