

Kenacort injectie bij littekens

Plastische chirurgie



Beter voor elkaar

Samen met uw behandelaar heeft u besloten om u te laten behandelen met een Kenacort injectie. In deze folder geven wij u meer informatie over deze behandeling.

Wat is een Kenacort injectie

Een Kenacort injectie is een injectie waar de werkzame stof triamcinolonacetonide in zit. Deze stof hoort tot de groep geneesmiddelen die bijnierschors hormonen of corticosteroiden worden genoemd. Corticosteroiden remmen langdurig ontstekingen en overgevoeligheidsreacties. Kenacort injecties worden gebruikt bij diverse aandoeningen (problemen) van o.a. de hand en pols en bij hypertrofische of keloïde littekens. Er kunnen verschillende doseringen worden gebruikt.

Soms wordt er aan de Kenacort injectie Lidocaïne toegevoegd. Lidocaïne is een verdovingsmiddel met een pijnstillende werking en verdooft tijdelijk de injectieplaats.

Kenacort voor littekenbehandeling

Kenacort injecties worden onder andere toegepast in de behandeling van abnormaal verdikte littekens, zoals hypertrofische littekens of keloïden. Een litteken ontstaat wanneer de huid zich herstelt na een huidbeschadiging als gevolg van een ongeval, huidziekte of een operatie.

Littekenhypertrofie

Een hypertrofisch litteken ontstaat binnen enkele weken nadat de huid is beschadigd. Hierbij is sprake van een te grote aanmaak van littekenweefsel, waardoor het litteken boven de omliggende huid komt te liggen. Het litteken is gezwollen, rood en dik, maar breidt zich niet uit buiten de oorspronkelijke huidbeschadiging. Soms is het pijnlijk en jeukt het. Het litteken kan uiteindelijk vanzelf minder zichtbaar worden maar dat kan een paar jaar duren.

Keloïd

Keloïd is een woekering (of gezwel) van littekenweefsel. Keloïde littekens zijn niet alleen verdikt, maar groeien ook buiten het oorspronkelijke wondgebied. Het litteken ligt op de huid, onregelmatig van structuur en is rood of donkerder dan de normale huidskleur. Ze kunnen pijn en jeuk veroorzaken. Keloïden kunnen ook maanden na de huidbeschadiging nog ontstaan en erger worden tijdens een zwangerschap. Dit soort litteken herstelt zich meestal niet vanzelf. Een keloïd komt vaker voor bij mensen met een getinte huidskleur.

Een keloïd kan ontstaan na iedere vorm van huidbeschadiging, bijv. een operatiewond, brandwond, vaccinatie, tatoeage, piercing of acné litteken.

Behandeling

U wordt in de juiste positie gezet waarbij u comfortabel bent en de behandelaar goed bij het litteken kan. Daarna wordt het te injecteren gebied gedesinfecteerd en wordt de vloeistof met een kleine naald in het litteken gespoten. Na de injectie krijgt u zo nodig een pleister en kunt u, als u zich goed genoeg voelt, direct naar huis.

De injectie laat het litteken in verloop van weken rijpen en gedeeltelijk smelten. Na 6–8 weken is het middel uitgewerkt en moet de behandeling zo nodig worden herhaald. Meestal zijn meerdere injecties nodig om het gewenste effect te behalen. Als nadeel geldt dat het smelten van het litteken soms niet gecontroleerd verloopt waardoor ook de omliggende huid dunner kan worden. Het litteken wordt door de behandeling vaak platter, maar niet smaller en wordt soms rimpelig. Meestal neemt de pijn en jeuk af.

Mogelijke bijwerkingen

Regelmatig

De pijnklachten kunnen als reactie op de injectie gedurende 2 tot 3 dagen verergeren. Tevens kan er wat zwelling ontstaan en kan het gebied warm aanvoelen.

Soms

U kunt enkele dagen na de injectie opvliegers (aanvallen van een warmte gevoel en rood hoofd) ervaren.

(Zeer) zelden

- Lokale huidafwijkingen: dunnere huid of verkleuringen van de huid.
- De bloedsuikerspiegel bij patiënten met suikerziekte (diabetes mellitus) raakt soms ontregeld. Wij adviseren u om de eerste 2 weken na uw injectie regelmatig uw bloedsuiker te controleren.
- Er kunnen hormonale schommelingen ontstaan, waardoor er menstruatiestoornissen kunnen optreden. Ook bij vrouwen die al in de overgang zijn geweest.
- Allergische reactie: huiduitslag, galbulten of jeuk.
- Spierklachten. Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen.

Adviezen voor thuis

Een pijnstillend middel, zoals paracetamol maximaal 4 maal daags 2 tabletten van 500 mg of een ice-pack kan verlichting geven.

Wanneer wordt er afgezien van een Kenacort injectie

- Allergie voor een van de bestanddelen
- Actieve infectie
- Verlaagde afweer
- Zwangerschap (in overleg met behandelaar)

Bijkomende behandelingen

In enkele gevallen kan er naast een injectie gekozen worden om het litteken aanvullend te behandelen. Dit kan door het gebruik van siliconengel of -pleister, drukleiding of bijvoorbeeld een drukoorbelt. Uw behandelaar zal u hierover informeren.

Heeft u nog vragen

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust aan de doktersassistente of neem contact op met:

Polikliniek Chirurgie en Plastische Chirurgie

T: 010 297 52 20

Telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag 8.15 – 16.30 uur.



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.