Videocapsule endoscopie

Maag–Darm–Levercentrum

Beter voor elkaar

Ikazia ziekenhuis

Inleiding

Met deze folder wil het Ikazia Ziekenhuis u informeren over de videocapsule–endoscopie die voor u gepland is. In de folder leest u wat een videocapsule–endoscopie is en hoe de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het onderzoek verlopen. We raden u aan deze informatie goed door te lezen. Houd er rekening mee dat uw situatie anders kan zijn dan wat hier beschreven staat.

Wat is een videocapsule (VCE)?

Een videocapsule–endoscopie (VCE) is een onderzoek waarbij foto's van de dunne darm worden gemaakt met een kleine camera in een capsule.

De capsule, die ongeveer zo groot is als een vitamine pil of antibiotica capsule, bevat een camera en een lichtbron. De camera maakt opnamen in uw darm en stuurt deze naar een recorder die u tijdens het onderzoek in een heupgordel draagt. De arts bekijkt later de opnamen om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. De capsule verlaat vanzelf uw lichaam via de ontlasting, wat geen pijn doet en niet vervelend is.

Voorbereiding

- Medicijnen: Stop een week voor het onderzoek met ijzertabletten (zoals FeroGradumet® of Ferrofumaraat), want die maken de darminhoud zwart en dat maakt het onderzoek moeilijker. U kunt na het onderzoek weer beginnen met deze medicijnen. Stop ook met medicijnen die de darmen langzamer laten werken, zoals codeïne en loperamide (Imodium®, Diacure®).
- Laxeermiddel: Uw darm moet schoon zijn. Daarom krijgt u een laxeermiddel (Colofort®) waarmee u de dag vóór het onderzoek start. U krijgt de instructies erbij en het recept gaat naar uw apotheek.
- Diabetes: Als u suikerziekte heeft en medicijnen daarvoor gebruikt, vraag dan om de folder over hoe u uw medicijnen moet aanpassen bij de diabetesverpleegkundige, het MDL–centrum, of de secretaresse van uw arts. Neem uw medicijnen en bloedsuikermeter mee naar het onderzoek.

- Pacemaker: Als u een pacemaker, ICD of neurostimulator heeft, overleg dit dan met uw arts.

Andere voorbereiding:

- Draag makkelijke kleding, zoals een joggingpak.
- Gebruik op de dag van het onderzoek geen bodylotion of lippenbalsem.
- Neem eventueel reserve ondergoed mee, dit kan handig zijn na het laxeren.

Het onderzoek:

- Meld u eerst aan bij de zuil in de centrale hal en daarna bij het MDL–centrum (route 19).
- Een medewerker bevestigt een band met een sensor om uw middel en geeft u een tas met de datarecorder. U slikt de capsule in met wat water.
- Na ongeveer een uur wordt gekeken of de capsule uw maag heeft verlaten. Als dat zo is, mag u naar huis en mag u 4 uur later een lichte maaltijd eten. De precieze tijd waarop u een lichte maaltijd mag eten, wordt met u afgesproken.
- U krijgt uitleg over hoe u de apparatuur moet afkoppelen.
- De volgende ochtend brengt u de apparatuur terug naar het MDL–centrum.

Regels voor thuis:

- Probeer zoveel mogelijk te lopen en drink elk uur een beker water.
- Haal de apparatuur niet van uw lichaam af en zorg dat deze niet nat wordt.
- Vermijd stoten, schokken en sterke magnetische velden (zoals bij een MRI).
- Rook niet vanaf één dag voor het onderzoek totdat u de apparatuur hebt ingeleverd.
- Gebruik geen medicijnen die de darmen beïnvloeden.
- Buig zo min mogelijk voorover

Eventuele bij- of nawerkingen

De kans op complicaties is bij dit onderzoek klein. Er is een kleine kans dat de videocapsule vast blijft zitten in de darm als er een vernauwing van de darm is, bijvoorbeeld door eerdere ontsteking of een tumor van de darm. Dit kan klachten veroorzaken zoals een opgezette buik, pijn, misselijkheid of braken. Als de capsule vast blijft zitten moet deze soms met een kijkonderzoek of een operatie worden verwijderd.

Na het onderzoek:

- De volgende ochtend levert u de apparatuur in bij het MDL-centrum. De capsule verlaat uw lichaam binnen 1 tot 2 dagen via de ontlasting. Als dit niet gebeurt of als u klachten heeft, neem dan contact op met het MDL-centrum.
- Als u een MRI-scan moet ondergaan en de capsule is nog niet uit uw lichaam, neem dan contact op met het MDL-centrum, want dit kan gevaarlijk zijn.

Resultaten:

De dokter bespreekt de resultaten van het onderzoek met u tijdens een controleafspraak. Bij vragen of als u medische hulp nodig heeft, kunt u bellen:

Contact

Maandag tot en met vrijdag van 08.15 – 16.30 uur: 010 297 53 74 (MDL-centrum)
Buiten kantooruren: 010 297 50 00 (vraag naar de arts-assistent van de spoedeisende hulp)
Als u vragen heeft, lees dan eerst de folder opnieuw door of gebruik de Beter Dichtbij App.

Let op: *In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.*

Please note: *This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.*

Dikkat: *Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.*

Uwaga: *Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.*

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Endoscopie, Videocapsule
800149-NL / 2025-04