Glucose ademtest

Maag–Darm–Levercentrum

Beter voor elkaar

Ikazia ziekenhuis

Inleiding

Met deze folder wil het Ikazia ziekenhuis u informatie geven over de glucose ademtest .We leggen aan u uit wat een glucose ademtest met glucose is en hoe de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg van het onderzoek verloopt.

Wat is een glucose ademtest?

Bij deze test wordt gekeken of er sprake is van bacteriegroei in het bovenste deel van de dunne darm.

Voorbereiding

Op de dag van het onderzoek mag u 's morgens niet eten, drinken, tanden poetsen of roken. Ook is het gebruik van mondwater of kauwgom niet toegestaan.
Het is belangrijk dat u **de dag voor het onderzoek** bepaalde voedingsmiddelen **niet** gebruikt:

- Peulvruchten (erwten, sperziebonen, snijbonen, bonen, linzen, kapucijners), pinda's en pindakaas;
- Koolsoorten (spruiten, zuurkool, bloemkool);
- Uien, prei, radijs, paprika, asperges, taugé, champignons, knoflook (let hierbij ook op gemarineerd vlees/hamburgers en (sla)sauzen);
- Kant en klare kruiden in zakjes of pakjes;
- Alcoholische dranken.

Als u de afgelopen 2 weken antibiotica heeft geslikt of nu nog gebruikt, neem dan contact op met het MDL–centrum. Het kan zijn dat u dan een nieuwe afspraak moet maken.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op het Maag–Darm–Levercentrum op de eerste etage, routenummer 19.
Als u aankomt, meldt u zich aan bij de aanmeldzuil. Daarna wordt u opgehaald door de assistent.

Het doen van de proef

U moet 2 keer in een blaaspijpje blazen, de eerste keer direct voor de proefmaaltijd, de tweede keer 2 uur na de proefmaaltijd.
Een proefmaaltijd is opgeloste glucose dat u op moet drinken.
Als u jonger bent dan 16 jaar moet u elke 30 minuten blazen. In beide gevallen geldt dat u gedurende de twee uur na de proefmaaltijd niets mag gebruiken.
Nadat u na de proefmaaltijd weer geblazen heeft kan de uitslag afgelezen worden op de meetapparatuur. Uw behandelend arts zal de uitslag op het spreekuur met u bespreken.

Bijwerkingen van de proef

Als niet goed tegen glucose kan, kunt u na het innemen van de glucosedrank last krijgen van darmkrampen en diarree. Dit duurt meestal niet lang, maar u moet het wel aan de verpleegkundige doorgeven.

Telefoonnummers

Mocht u thuis nog vragen hebben over het onderzoek, belt u dan naar het MDL–centrum Ikazia:
T 010 297 53 74

www.ikazia.nl

Let op: *In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.*

Please note: *This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.*

Dikkat: *Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.*

Uwaga: *Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.*

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Ademtest, glucose
800152-NL / 2022-10