

Besnijdenis / circumcisie onder narcose

Urologie/chirurgie



Beter voor elkaar

Besnijdenis / circumcisie onder narcose

Inleiding

Uw huisarts heeft uw zoon verwezen voor een besnijdenis. Als uw kind jonger is dan twaalf jaar, heeft de arts daarvoor uw toestemming nodig. Is uw kind twaalf jaar of ouder dan is behalve uw toestemming ook de toestemming van uw kind zelf nodig. Vanaf zestien jaar mag uw kind zelfstandig over een medische behandeling beslissen.

Een besnijdenis kan nodig zijn in verband met een vernauwing van de voorhuid. In medische termen heet dit phimosis. Hierdoor kunnen moeilijkheden optreden bij het plassen of een ontsteking van de eikel of voorhuid en later ook pijn tijdens erectie en geslachtsgemeenschap. De voorhuid moet daarom worden verwijderd. Dit heet besnijdenis of circumcisie. Bepaalde godsdiensten schrijven besnijdenis van jongens voor. Dit kan dus ook een reden zijn om deze ingreep te laten doen, maar dit wordt echter vaak niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Ook zijn er ouders die bij hun zoon een besnijdenis wensen uit hygiënische redenen. Dit wordt vaak ook niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer in ieder geval bij uw verzekering of deze ingreep vergoed wordt.

Vorbereiding op de opname

Bij kinderen (tot ongeveer 16 jaar) vindt de operatie plaats onder algehele narcose. Daarom wordt er een dagopname afgesproken op de afdeling Dagbehandeling en gaat u met uw kind naar het spreekuur van de anesthesioloog. Bereid uw kind voor op de onbekende wereld van het ziekenhuis, de operatie en hoe uw kind zich na de operatie voelt. Het is verstandig om met uw kind naar de voorlichtingsmiddag te komen. Deze is op woensdag middagen. Raadzaam is om uw kind beetje bij beetje te vertellen wat er vóór en na de operatie gaat gebeuren. Vertel uw kind dat het waarschijnlijk een dagje in het ziekenhuis moet blijven. Uw kind heeft tijd nodig om die informatie op zijn gemak te verwerken.

Elke woensdagmiddag wordt een voorlichtingsmiddag georganiseerd voor kindertjes die geopereerd moeten worden. Voor informatie hierover kunt u bellen met:

Dagbehandeling 4 CJ

T 010 297 52 24


De behandeling

Is er alleen sprake van een vernauwing, dan kan bij kinderen eventueel een gedeeltelijke verwijdering van de voorhuid met verwijdingsplastiek worden verricht. Hierbij is de eikel nog voor een deel bedekt.

Dit is deels een cosmetische operatie, waarvan het uiteindelijke resultaat niet zeker kan worden voorspeld. Er is een verhoogde kans op het opnieuw optreden van vernauwing van de voorhuid, het een reden kan zijn om te kiezen voor een totale besnijdenis. Na chronische ontstekingen met vernauwing wordt in het algemeen de voorhuid geheel verwijderd. Er worden rondom oplosbare hechtingen geplaatst aan de basis van de eikel. Deze hechtingen lossen meestal na veertien dagen op en hoeven dus niet te worden verwijderd. De eikel is en blijft na de operatie onbedekt. Dit kan met name de eerste dagen gevoelig zijn en gedurende enkele weken een plaatselijke irritatie veroorzaken.

Er kunnen verklevingen aanwezig zijn tussen de voorhuid en de eikel. Deze worden tijdens de operatie losgemaakt. Hierdoor kan de eikel de eerste dagen na de operatie er soms rood, iets gezwollen of geïrriteerd uit zien. Doorgaans is dit niet verontrustend. Na één week ontstaat er geleidelijk een nieuwe huidlaag en verdwijnen de klachten. Na de operatie wordt de penis verbonden met een gaasje en speciale crème.

Duur ingreep



De ingreep duurt ongeveer twintig minuten. Daarna komt uw kind terug op de dagbehandeling en mag het nog even slapen of als het gelijk wakker is wat drinken en als dit goed gaat wat eten. Uw kind kan nog wankel lopen, door de lokale verdoving. Als uw kind geplast heeft wordt de penis verbonden met een gaasje met koelzalf. Deze tube krijgt u mee naar huis.

Nazorg thuis

Na 24 uur mag uw zoon weer douchen en na vijf dagen weer baden. De wond is dan voldoende dicht. De wond droogdeppen en nog gedurende twee à drie dagen dun insmeren met koelzalf.

Het is raadzaam de penis zoveel mogelijk hoog te dragen om zwelling te voorkomen. Een strakke luier, onderbroekje of zwembroekje kan daarbij helpen.

De eerste dagen kan tijdens het plassen een branderig gevoel ontstaan; bij doorplassen verdwijnt dit gewoonlijk weer. Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan, die kunnen gaan schrijnen. De hechtingen lossen

vanzelf op tussen de 10de en 20ste dag.

De dag na de operatie kunt u uw kind weer zijn gang laten gaan. Als uw zoontje al naar school gaat, kunt u hem beter enkele dagen thuis houden.

Zwemmen mag pas als de wond genezen is, na ongeveer twee weken.

Sporten mag hij pas na één à twee weken.

Na de ingreep blijft uw kind minimaal 2 uur op de afdeling, nadat hij geplast heeft mag hij naar huis.

Als ouder of verzorger krijgt u instructies mee over de wondverzorging

Na de ingreep krijgt u adviezen over de pijnstilling.

Wanneer een arts raadplegen

Complicaties komen zelden voor. Er kan een nabloeding optreden. Dit merkt u aan een bloederig verband of een bloeduitstorting onder een hechting.

Soms treedt een ontsteking in de wond op. Als de pijn steeds erger wordt, er pus of bloed uit de wond komt, de penis steeds dikker wordt of uw kind koorts krijgt boven de 38.5°C, moet u contact opnemen met de uroloog. In het weekend en avond/nacht kunt u met uw vragen terecht bij de dienstdoende huisarts, die u eventueel doorverwijst naar het ziekenhuis.

Vragen

Als u vragen hebt over de behandeling, kunt u deze altijd stellen aan de arts of verpleegkundige van de polikliniek Urologie/chirurgie.

Zij geven u graag antwoord.

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 – 16.00 uur.

U kunt bij bovenstaande klachten contact opnemen met de afdeling dagbehandeling (maandag tot vrijdag tijdens kantooruren):

T 010 297 52 24

Of de polikliniek chirurgie (als de operatie door de chirurg uitgevoerd is):

T 010 297 52 20

Of de polikliniek urologie (als de operatie door de uroloog uitgevoerd is):

T 010 297 54 50



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.